

パーキンソン病 (10 問)

はき国家試験 臨床医学各論

はき 24-55 まだら認知症がよくみられるのはどれか。

1. パーキンソン病
2. アルツハイマー型老年認知症
3. ピック病
4. 脳血管性認知症

はき 18-63 パーキンソン病の非運動症状として適切なのはどれか。

1. 視力障害
2. 失語症
3. 起立性低血圧
4. 乏尿

はき 17-63 パーキンソン病の振戦が最も起こりやすいのはどれか。

1. じっとしているとき
2. 何か物を取ろうとするとき
3. 字を書くとき
4. からだの前で手を保持するとき

はき 16-75 パーキンソン病について誤っている記述はどれか。

1. 50～60 歳代で初発する。
2. 手指振戦は通常左右同時に出現する。
3. 進行すると前傾前屈姿勢となる。
4. 種々の自律神経症状がみられる。

はき 12-86 疾患と病変部位との組合せで誤っているのはどれか。

1. 筋萎縮性側索硬化症 — 脊髓前角
2. ポリオ — 脳幹網様体
3. 重症筋無力症 — 神経筋接合部
4. パーキンソン病 — 中脳黒質

はき 11-68 爆発性発語がみられるのはどれか。

1. 重症筋無力症
2. 筋萎縮性側索硬化症
3. オリブ橋小脳萎縮症
4. パーキンソン病

はき 8-85 感染による中枢神経疾患はどれか。

1. 麻痺性痴呆
2. 脊髄空洞症
3. パーキンソン病
4. 脊髄小脳変性症

はき 7-86 神経疾患と症状との組合せで誤っているのはどれか。

1. パーキンソン病 — 無 動
2. 進行性筋ジストロフィー症 — 筋強剛（固縮）
3. 脊髄空洞症 — 感覚解離
4. アテトーゼ — 不随意運動

はき 4-82 疾患と症状との組合せで誤っているのはどれか。

1. ウィルソン病 — 羽ばたき振戦
2. 脊髄空洞症 — 感覚解離
3. 筋萎縮性側索硬化症 — 筋力低下
4. パーキンソン病 — 視力障害

はき 3-86 パーキンソン病の症状でないのはどれか。

1. 筋強剛（固縮）
2. 振 戦
3. 無 動
4. 難 聴

パーキンソン病（9問）

はき国家試験 臨床医学総論

はき 27-48 異常歩行と疾患の組合せで正しいのはどれか。

1. 突進歩行 ————— 変形性膝関節症
2. あひる歩行 ————— 進行性筋ジストロフィー
3. はさみ脚歩行 ————— パーキンソン病
4. 硬性墜落性破行 ————— 脳性麻痺

はき 27-49 疾患と視診所見の組み合わせで誤っているのはどれか。

1. 帯状疱疹 ————— 胸背部の発赤・水疱
2. 肝硬変 ————— 眼球結膜の黄染
3. パーキンソン病 ———— 水牛様肩
4. バセドウ病 ————— 眼球突出

はき 24-47 レイノー現象がみられるのはどれか。

1. 原発性アルドステロン症
2. アジソン病
3. 全身性硬化症(強皮症)
4. パーキンソン病

はき 22-55 発疹がみられるのはどれか。

1. ベーチェット病
2. パーキンソン病
3. メニエール病
4. アルツハイマー病

はき 18-60 疾患と視診の組合せで誤っているのはどれか。

1. アジソン病 — 満月様顔貌
2. 肝硬変 — クモ状血管腫
3. 全身性エリテマトーデス — 蝶形紅斑
4. パーキンソン病 — 前傾姿勢

はき 16-53 歩行異常と疾患との組合せで誤っているのはどれか。

1. 間欠跛行 — 脊柱管狭窄症
2. トレンデレンブルグ徴候 — 側弯症
3. 分回し歩行 — 脳卒中
4. すくみ足 — パーキンソン病

はき 15-56 歩容と疾患との組合せで誤っているのはどれか。

1. 疼痛性跛行 — 変形性股関節症
2. 間欠跛行 — 閉塞性動脈硬化症
3. 失調性歩行 — パーキンソン病
4. アヒル歩行 — 先天性股関節脱臼

はき 9-61 誤っている組合せはどれか。

1. 脊柱側弯 — 坐骨神経痛
2. 亀背 — くる病
3. 前傾位 — パーキンソン病
4. 腰椎後弯 — 進行性筋ジストロフィー

はき 6-68 鶏歩を示すのはどれか。

1. 腓骨神経麻痺
2. 進行性筋ジストロフィー症
3. 片麻痺
4. パーキンソン病

パーキンソン病（5問）

あまし国家試験 臨床医学各論

あ 26-79 パーキンソン病でよくみられるのはどれか。

1. 反張膝
2. 分回し歩行
3. 小刻み歩行
4. 膝折れ

あ 23-57 パーキンソン病でよくみられるのはどれか。

1. 痙性麻痺
2. アテトーゼ
3. 見当識障害
4. 突進現象

あ 11-95 疾患と症状との組合せで正しいのはどれか。

1. ウィルソン病 — 片麻痺
2. クロイツフェルト・ヤコブ病 — 認知症
3. アルツハイマー病 — 感覚障害
4. パーキンソン病 — アテトーゼ

あ 6-81 パーキンソン病の徴候はどれか。

1. 痙性麻痺
2. 筋萎縮
3. 振戦
4. 感覚障害

あ 5-92 パーキンソン病の症状で誤っているのはどれか。

1. 振 戦
2. 感覚障害
3. 無 動
4. 仮面様顔貌

パーキンソン病（7問）

あまし国家試験 臨床医学総論

あ 24-47 感覚鈍麻を伴う末梢神経障害がみられるのはどれか。

1. パーキンソン病
2. ギラン・バレー症候群
3. ウィルソン病
4. アルツハイマー病

あ 24-53 歩行異常と疾患の組合せで正しいのはどれか。

1. 間欠跛行 —— 小脳変性症
2. 失調性歩行 —— 多発筋炎
3. 突進歩行 —— パーキンソン病
4. 痙性歩行 —— 筋ジストロフィー

あ 21-61 発熱がみられやすいのはどれか。

1. アジソン病
2. 悪性貧血
3. パーキンソン病
4. 全身性エリテマトーデス

あ 18-59 歩行異常と疾患との組合せで正しいのはどれか。

1. 動揺性歩行 — 多発性神経炎
2. 痙性歩行 — 筋ジストロフィー症
3. 鶏 歩 — 胸髄部脊髄腫瘍
4. 突進現象 — パーキンソン病

あ 18-64 貧血をきたす疾患はどれか。

1. パーキンソン病
2. 高血圧症
3. 全身性エリテマトーデス
4. 高脂血症

あ 11-76 静止時振戦が特徴的にみられるのはどれか。

1. パーキンソン病
2. 甲状腺機能亢進症
3. 多発性硬化症
4. アルコール中毒

あ 8-76 振戦を主訴とする疾患はどれか。

1. 進行性球麻痺
2. 脳梗塞
3. パーキンソン病
4. ギラン・バレー症候群

パーキンソン病 (10 問)

はき国家試験 臨床医学各論

はき 24-55 まだら認知症がよくみられるのはどれか。

1. パーキンソン病
2. アルツハイマー型老年認知症
3. ピック病
4. **脳血管性認知症**

はき 18-63 パーキンソン病の非運動症状として適切なのはどれか。

1. 視力障害
2. 失語症
3. **起立性低血圧**
4. 乏尿

はき 17-63 パーキンソン病の振戦が最も起こりやすいのはどれか。

1. **じっとしているとき**
2. 何か物を取ろうとするとき
3. 字を書くとき
4. からだの前で手を保持するとき

はき 16-75 パーキンソン病について誤っている記述はどれか。

1. 50~60 歳代で初発する。
2. **手指振戦は通常左右同時に出現する。**
3. 進行すると前傾前屈姿勢となる。
4. 種々の自律神経症状がみられる。

はき 12-86 疾患と病変部位との組合せで誤っているのはどれか。

1. 筋萎縮性側索硬化症 — 脊髓前角
2. **ポリオ — 脳幹網様体**
3. 重症筋無力症 — 神経筋接合部
4. パーキンソン病 — 中脳黒質

はき 11-68 爆発性発語がみられるのはどれか。

1. 重症筋無力症
2. 筋萎縮性側索硬化症
3. **オリブ橋小脳萎縮症**
4. パーキンソン病

はき 8-85 感染による中枢神経疾患はどれか。

1. **麻痺性痴呆**
2. 脊髄空洞症
3. パーキンソン病
4. 脊髄小脳変性症

はき 7-86 神経疾患と症状との組合せで誤っているのはどれか。

1. パーキンソン病 — 無 動
2. **進行性筋ジストロフィー症** — **筋強剛（固縮）**
3. 脊髄空洞症 — 感覚解離
4. アテトーゼ — 不随意運動

はき 4-82 疾患と症状との組合せで誤っているのはどれか。

1. ウィルソン病 — 羽ばたき振戦
2. 脊髄空洞症 — 感覚解離
3. 筋萎縮性側索硬化症 — 筋力低下
4. **パーキンソン病** — **視力障害**

はき 3-86 パーキンソン病の症状でないのはどれか。

1. 筋強剛（固縮）
2. 振 戦
3. 無 動
4. **難 聴**

パーキンソン病（9問）

はき国家試験 臨床医学総論

はき 27-48 異常歩行と疾患の組合せで正しいのはどれか。

1. 突進歩行 ———— 変形性膝関節症
2. **あひる歩行** ————— **進行性筋ジストロフィー**
3. はさみ脚歩行 ————— パーキンソン病
4. 硬性墜落性破行 ————— 脳性麻痺

はき 27-49 疾患と視診所見の組み合わせで誤っているのはどれか。

1. 帯状疱疹 ————— 胸背部の発赤・水疱
2. 肝硬変 ————— 眼球結膜の黄染
3. パーキンソン病 ———— 水牛様肩
4. バセドウ病 ————— 眼球突出

はき 24-47 レイノー現象がみられるのはどれか。

1. 原発性アルドステロン症
2. アジソン病
3. 全身性硬化症(強皮症)
4. パーキンソン病

はき 22-55 発疹がみられるのはどれか。

1. ベーチェット病
2. パーキンソン病
3. メニエール病
4. アルツハイマー病

はき 18-60 疾患と視診の組合せで誤っているのはどれか。

1. アジソン病 ———— 満月様顔貌
2. 肝硬変 ————— クモ状血管腫
3. 全身性エリテマトーデス — 蝶形紅斑
4. パーキンソン病 ———— 前傾姿勢

はき 16-53 歩行異常と疾患との組合せで誤っているのはどれか。

1. 間欠跛行 ————— 脊柱管狭窄症
2. トレンデレンブルグ徴候 — 側弯症
3. 分回し歩行 ————— 脳卒中
4. すくみ足 ————— パーキンソン病

はき 15-56 歩容と疾患との組合せで誤っているのはどれか。

1. 疼痛性跛行 — 変形性股関節症
2. 間欠跛行 — 閉塞性動脈硬化症
3. 失調性歩行 — パーキンソン病
4. アヒル歩行 — 先天性股関節脱臼

はき 9-61 誤っている組合せはどれか。

1. 脊柱側弯 — 坐骨神経痛
2. 亀背 — くる病
3. 前傾位 — パーキンソン病
4. 腰椎後弯 — 進行性筋ジストロフィー

はき 6-68 鶏歩を示すのはどれか。

1. 腓骨神経麻痺
2. 進行性筋ジストロフィー症
3. 片麻痺
4. パーキンソン病

パーキンソン病（5問）

あまし国家試験 臨床医学各論

あ 26-79 パーキンソン病でよくみられるのはどれか。

1. 反張膝
2. 分回し歩行
3. 小刻み歩行
4. 膝折れ

あ 23-57 パーキンソン病でよくみられるのはどれか。

1. 痙性麻痺
2. アテトーゼ
3. 見当識障害
4. 突進現象

あ 11-95 疾患と症状との組合せで正しいのはどれか。

1. ウィルソン病 — 片麻痺
2. クロイツフェルト・ヤコブ病 — 認知症
3. アルツハイマー病 — 感覚障害
4. パーキンソン病 — アテトーゼ

あ 6-81 パーキンソン病の徴候はどれか。

1. 痙性麻痺
2. 筋萎縮
3. 振戦
4. 感覚障害

あ 5-92 パーキンソン病の症状で誤っているのはどれか。

1. 振 戦
2. 感覚障害
3. 無 動
4. 仮面様顔貌

パーキンソン病（7問）

あまし国家試験 臨床医学総論

あ 24-47 感覚鈍麻を伴う末梢神経障害がみられるのはどれか。

1. パーキンソン病
2. ギラン・バレー症候群
3. ウィルソン病
4. アルツハイマー病

あ 24-53 歩行異常と疾患の組合せで正しいのはどれか。

1. 間欠跛行 —— 小脳変性症
2. 失調性歩行 —— 多発筋炎
3. 突進歩行 —— パーキンソン病
4. 痙性歩行 —— 筋ジストロフィー

あ 21-61 発熱がみられやすいのはどれか。

1. アジソン病
2. 悪性貧血
3. パーキンソン病
4. 全身性エリテマトーデス

あ 18-59 歩行異常と疾患との組合せで正しいのはどれか。

1. 動揺性歩行 — 多発性神経炎
2. 痙性歩行 — 筋ジストロフィー症
3. 鶏 歩 — 胸髄部脊髄腫瘍
4. 突進現象 — パーキンソン病

あ 18-64 貧血をきたす疾患はどれか。

1. パーキンソン病
2. 高血圧症
3. 全身性エリテマトーデス
4. 高脂血症

あ 11-76 静止時振戦が特徴的にみられるのはどれか。

1. パーキンソン病
2. 甲状腺機能亢進症
3. 多発性硬化症
4. アルコール中毒

あ 8-76 振戦を主訴とする疾患はどれか。

1. 進行性球麻痺
2. 脳梗塞
3. パーキンソン病
4. ギラン・バレー症候群