

(急性糸球体腎炎/慢性糸球体腎炎)

はき 5-71 急性糸球体腎炎の症状で正しいのはどれか。

1. 多 尿
2. 細菌尿
3. 血 尿
4. 糖 尿

はき 5-73 腎疾患で高血圧を特徴としないのはどれか。

1. ネフローゼ症候群
2. 慢性糸球体腎炎
3. 急性糸球体腎炎
4. 腎硬化症

はき 7-71 糖尿病の合併症で誤っているのはどれか。

1. 網膜症
2. 末梢動脈閉塞
3. 末梢神経障害
4. 急性糸球体腎炎

はき 14-70 急性糸球体腎炎について正しい記述はどれか。

1. 溶血性連鎖球菌感染が原因となる。
2. 先行感染から数ヵ月後に発症する。
3. 血清補体価は高値となる。
4. 発症直後は高蛋白食を与える。

はき 16-67 腎前性急性腎不全の病因はどれか。

1. 脱 水
2. ミオグロビン尿症
3. 尿管結石
4. 糸球体腎炎

はき 22-71 腎疾患と所見との組合せで正しいのはどれか。

1. 急性糸球体腎炎 ———— 低血圧
2. ネフローゼ症候群 ——— 低コレステロール血症
3. 急性腎不全 ————— 代謝性アシドーシス
4. 慢性腎不全 ————— 低リン血症

はき 27-60 腎前性急性腎不全の病因はどれか。

1. 広範囲熱傷
2. 前立腺癌
3. 急性糸球体腎炎
4. ミオグロビン尿症

はき 29-57 腎疾患と所見の組合せで正しいのはどれか。

1. 急性糸球体腎炎 ————— 低血圧
2. 慢性腎不全 ————— 高リン血症
3. 急性腎不全 ————— 代謝性アルカローシス
4. ネフローゼ症候群 ————— 低コレステロール血症

はき 31-50 急性糸球体腎炎について正しいのはどれか。

1. 予後は良好である。
2. 高齢者に多い。
3. 血清補体価は上昇する。
4. 細菌尿がみられる。

はき 5-73 腎疾患で高血圧を特徴としないのはどれか。

1. ネフローゼ症候群
2. 慢性糸球体腎炎
3. 急性糸球体腎炎
4. 腎硬化症

はき 13-81 ネフローゼ症候群の特徴でないのはどれか。

1. 全身浮腫
2. ミオグロビン尿症
3. 低蛋白血症
4. 高脂血症

はき 19-75 ネフローゼ症候群をきたす疾患はどれか。

1. 膀胱炎
2. 間質性腎炎
3. ループス腎炎
4. 腎盂腎炎

はき 22-71 腎疾患と所見との組合せで正しいのはどれか。

1. 急性糸球体腎炎 ———— 低血圧
2. ネフローゼ症候群 ———— 低コレステロール血症
3. 急性腎不全 ————— 代謝性アシドーシス
4. 慢性腎不全 ————— 低リン血症

はき 24-58 月経異常の原因とならないのはどれか。

1. ネフローゼ症候群
2. クッシング症候群
3. 子宮筋腫
4. 神経性食思不振症

はき 26-78 「40歳の女性。数年前より手指のこわばりを自覚していた。最近、症状の増悪と手指の関節痛、腫脹が認められ来院した。冷たいものに触ると手指が白くなることがある。検査では抗トポイソメラーゼⅠ抗体(抗 Scl-70)が陽性であった。」

本疾患の合併症として最も多いのはどれか。

1. ブドウ膜炎
2. ネフローゼ症候群
3. 逆流性食道炎
4. シェーグレン症候群

はき 32-58 ネフローゼ症候群について正しいのはどれか。

1. 血清コレステロールが低値となる。
2. 低蛋白質血症を認める。
3. 蛋白質は陰性である。
4. 小児では予後不良である。

臨床医学各論 腎・尿器疾患 キーワード：急性腎不全 P. 82	
---------------------------------	--

はき 16-67 腎前性急性腎不全の病因はどれか。

1. 脱水
2. ミオグロビン尿症
3. 尿管結石
4. 糸球体腎炎

はき 22-71 腎疾患と所見との組合せで正しいのはどれか。

1. 急性糸球体腎炎 ———— 低血圧
2. ネフローゼ症候群 ———— 低コレステロール血症
3. 急性腎不全 ———— 代謝性アシドーシス
4. 慢性腎不全 ———— 低リン血症

はき 27-60 腎前性急性腎不全の病因はどれか。

1. 広範囲熱傷
2. 前立腺癌
3. 急性糸球体腎炎
4. ミオグロビン尿症

はき 29-57 腎疾患と所見の組合せで正しいのはどれか。

1. 急性糸球体腎炎 ———— 低血圧
2. 慢性腎不全 ———— 高リン血症
3. 急性腎不全 ———— 代謝性アルカローシス
4. ネフローゼ症候群 ———— 低コレステロール血症

臨床医学各論 腎・尿器疾患 キーワード：慢性腎不全 P. 85	
---------------------------------	--

はき 3-71 慢性腎不全で低値を示す検査値はどれか。

1. 血清尿素窒素
2. クレアチニークリアランス
3. 血清尿酸
4. 血清カリウム

はき 4-74 慢性腎不全で適切でない検査所見はどれか。

1. 血清尿素窒素高値
2. 血清クレアチニン高値
3. 尿濃縮力増加
4. 代謝性アシドーシス

はき 11-69 慢性腎不全で高値を示すのはどれか。

1. 血中エリスロポイエチン
2. 糸球体ろ過値
3. 血中カルシウム
4. 血中カリウム

はき 20-73 慢性腎不全でみられるのはどれか。

1. 多血症
2. 血清尿素窒素低値
3. 低リン血症
4. 高血圧症

はき 22-71 腎疾患と所見との組合せで正しいのはどれか。

1. 急性糸球体腎炎 ———— 低血圧
2. ネフローゼ症候群 —— 低コレステロール血症
3. 急性腎不全 ————— 代謝性アシドーシス
4. 慢性腎不全 ————— 低リン血症

はき 23-72 慢性腎不全でみられるのはどれか。

1. 低カリウム血症
2. 高ナトリウム血症
3. 高リン血症
4. 高カルシウム血症

はき 25-72 慢性腎不全の検査所見で誤っているのはどれか。

1. 糸球体ろ過値（GFR）の上昇
2. 血清クレアチニン値の上昇
3. 高カリウム血症
4. 正球性正色素性貧血

はき 29-57 腎疾患と所見の組合せで正しいのはどれか。

1. 急性糸球体腎炎 ————— 低血圧
2. 慢性腎不全 ————— 高リン血症
3. 急性腎不全 ————— 代謝性アルカローシス
4. ネフローゼ症候群 —— 低コレステロール血症

はき 5-73 腎疾患で高血圧を特徴としないのはどれか。

1. ネフローゼ症候群
2. 慢性糸球体腎炎
3. 急性糸球体腎炎
4. 腎硬化症

はき 8-70 腎盂腎炎を起こしにくいのはどれか。

1. 馬蹄腎
2. 尿路結石
3. 膀胱尿管逆流現象
4. 尿崩症

はき 19-75 ネフローゼ症候群をきたす疾患はどれか。

1. 膀胱炎
2. 間質性腎炎
3. ループス腎炎
4. 腎盂腎炎

次の文で示す症例について、はき 30-87、はき 30-88 の問いに答えよ。

「55 歳の女性。2 か月前から背部の鈍痛が続いていたが放置していた。発熱はないが、食欲不振、体重減少、倦怠感がある。」

はき 30-87 最も疑われる疾患はどれか。

1. 子宮筋腫
2. 尿路結石
3. 腎盂腎炎
4. 膵臓癌

はき 30-88 行うべき検査で最も適切なのはどれか。

1. 腹部超音波検査
2. 尿沈渣
3. 血液像（白血球分画）
4. 腹部エックス線検査

はき 2-87 側腹部の仙痛と血尿とがみられる疾患はどれか。

1. 膀胱炎
2. 急性腎炎
3. 尿路結石症
4. 膀胱腫瘍

はき 4-75 排尿異常で適切でない記述はどれか。

1. 膀胱炎では頻尿になりやすい。
2. 尿管結石では多尿になりやすい。
3. 神経因性膀胱では切迫性尿失禁になりやすい。
4. 前立腺肥大では尿閉になりやすい。

はき 19-75 ネフローゼ症候群をきたす疾患はどれか。

1. 膀胱炎
2. 間質性腎炎
3. ループス腎炎
4. 腎盂腎炎

はき 29-56 急性膀胱炎について正しいのはどれか。

1. 男性に多い。
2. 排尿後の痛みが多い。
3. 原因菌は黄色ブドウ球菌が多い。
4. 水分はあまり摂らない方がよい。

はき 2-87 側腹部の仙痛と血尿とがみられる疾患はどれか。

1. 膀胱炎
2. 急性腎炎
3. 尿路結石症
4. 膀胱腫瘍

はき 4-75 排尿異常で適切でない記述はどれか。

1. 膀胱炎では頻尿になりやすい。
2. 尿管結石では多尿になりやすい。
3. 神経因性膀胱では切迫性尿失禁になりやすい。
4. 前立腺肥大では尿閉になりやすい。

はき 14-75 腰背部痛の原因で生命の危険をきたすのはどれか。

1. 腰部脊柱管狭窄症
2. 子宮内膜症
3. 尿管結石
4. 解離性大動脈瘤

はき 16-67 腎前性急性腎不全の病因はどれか。

1. 脱水
2. ミオグロビン尿症
3. 尿管結石
4. 糸球体腎炎

はき 24-69 高尿酸血症について正しいのはどれか。

1. ヒスタミンと関連がある。
2. 尿管結石の原因となる。
3. 痛風発作の初発部位は手の指節間関節である。
4. 自己免疫疾患である。

はき 1-71 前立腺肥大で誤っているのはどれか。

1. 直腸内指診では正常の硬さである。
2. 残尿感は飲酒によって強くなる。
3. 老人に多い。
4. 性腺摘出術を行う。

はき 4-75 排尿異常で適切でない記述はどれか。

1. 膀胱炎では頻尿になりやすい。
2. 尿管結石では多尿になりやすい。
3. 神経因性膀胱では切迫性尿失禁になりやすい。
4. 前立腺肥大では尿閉になりやすい。

はき 24-60 前立腺肥大症について正しいのはどれか。

1. 若年者に多い。
2. 夜間頻尿がみられる。
3. 蛋白尿がみられる。
4. 下腹痛を伴うことが多い。

はき 27-62 前立腺肥大症について正しいのはどれか。

1. 蛋白尿がみられる。
2. 夜間頻尿がみられる。
3. 直腸指診では石のように硬く触れる。
4. 骨転移がみられる。

はき 33-65 前立腺肥大症の初期症状はどれか。

1. 血尿
2. 尿失禁
3. 夜間頻尿
4. 排尿時痛

はき 27-60 腎前性急性腎不全の病因はどれか。

1. 広範囲熱傷
2. 前立腺癌
3. 急性糸球体腎炎
4. ミオグロビン尿症

はき 30-60 腎前性腎不全の病因はどれか。

1. 出血性ショック
2. 前立腺癌
3. 後腹膜腫瘍
4. 急性腎炎症候群