

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 33) 東洋医学臨床論	127～160
-----------------	---------

はき 33-127 次の症例で最も考えられる頭痛はどれか。「43 歳の女性。月に 15 回以上の頭痛を自覚。ズキズキしたり、締め付けられたりする痛みがある。特に起床時に強く自覚。ここ 1 年は鎮痛薬を頻繁に服用している。頭部 MRI 検査では異常はない。」

1. 群発頭痛
2. 片頭痛
3. 緊張型頭痛
4. 薬物使用過多による頭痛

はき 33-128 次の症例で最も考えられる疾患はどれか。「82 歳の男性。1 年前から両上肢の痛みとしびれ、半年前から両下肢のしびれが出現。物がつかみにくくなり、歩行もぎこちなくなった。四肢の深部反射亢進がみられる。ジャクソンテストは陰性。めまい、悪心はない。」

1. バレー・リュウ症候群
2. 胸郭出口症候群
3. 頸椎症性脊髄症
4. 頸椎症性神経根症

はき 33-129 腰椎椎間板ヘルニアによる L5 神経根障害において、罹患高位のデルマトーム上に刺鍼を行う際、最も適切な経穴はどれか。

1. 伏 兎
2. 地 機
3. 条 口
4. 金 門

はき 33-130 次の徒手検査法と同様の病態を確認する検査はどれか。「肘関節伸展のまま肩関節を伸展すると肩関節前面に痛みが誘発され、この状態から肘関節を屈曲すると痛みが消失した。」

1. ライトテスト
2. スピードテスト
3. ダウバーンサイン
4. ペインフルアークサイン

はき 33-131 坐骨神経の絞扼性神経障害で陽性となる徒手検査はどれか。

1. パトリックテスト
2. ゲンスレンテスト
3. エリーテスト
4. ペイステスト

はき 33-132 次の症例で、患者に自由に文章を書かせたときにみられる所見として最も適切なのはどれか。

「68歳の男性。利き手の静止時振戦、上肢の歯車様筋強剛、歩行時のすくみ足がみられる。」

1. 吃書
2. 書痙
3. 小字症
4. 自発書字障害

はき 33-133 次の症例で最も適切な疾患はどれか。「50歳の男性。数日前から右の耳に痛みがあり、しばらくして難聴、同側の表情筋の麻痺と外耳孔の水疱が出現。」

1. 脳幹梗塞
2. ベル麻痺
3. 聴神経腫瘍
4. ラムゼイハント症候群

はき 33-134 肘部管症候群の原因となる筋の触察部位として最も適切なのはどれか。

1. 上腕骨内側上顆下縁から舟状骨
2. 上腕骨内側上顆下縁から豆状骨
3. 上腕骨外側上顆上縁から橈骨茎状突起
4. 上腕骨外側上顆下縁から手関節後面横紋中央

はき 33-135 次の症例で最も考えられる疾患はどれか。「75歳の男性。数か月前から両側の足趾の冷えとしびれを自覚。散歩中に下腿の痛みも出るが、休憩すれば歩くことができ、下肢の筋力低下はみられない。血圧は高く、喫煙歴は長い。ケンプテストは陰性。」

1. 腰部脊柱管狭窄症
2. 腰椎椎間板ヘルニア
3. 閉塞性動脈硬化症
4. 脊椎分離すべり症

はき 33-136 次の症例で適切な局所治療部位はどれか。「42歳の女性。主訴は右の母指から中指にかけての痛みとしびれ。母指球・手根部には症状はない。手を振ると楽になることがある。ファレンテストは陽性。」

1. 大陵と労宮の間
2. 少海と孔最の間
3. 小海と支正の間
4. 消灤と曲池の間

はき 33-137 次の症例で異常が認められる検査法として最も適切なのはどれか。「75歳の女性。100m程度の歩行で左下肢後面に痛みやしびれが出現するが、低い手押し車の使用で症状は出ない。足の冷感や膀胱直腸障害はない。」

1. SLRテスト
2. アキレス腱反射
3. バビンスキー反射
4. フライバーグテスト

はき 33-138 うつ病患者でみられる妄想として最も適切なのはどれか。

1. 関係妄想
2. 血統妄想
3. 罪責妄想
4. 物盗られ妄想

はき 33-139 鉄欠乏性貧血患者への食事指導で、ヘム鉄が豊富な食材として推奨すべきなのはどれか。

1. 卵
2. 大豆
3. 豚レバー
4. ホウレンソウ

はき 33-140 投球動作で肘関節後方への伸展ストレスが起こる時期として最も適切なのはどれか。

1. 早期コッキング期
2. 後期コッキング期
3. 加速期
4. フォロースルー期

はき 33-141 中指伸展テストが陽性となるテニス肘で、罹患筋への局所治療穴として最も適切なのはどれか。

1. 手三里
2. 曲 沢
3. 小 海
4. 天 井

はき 33-142 下腿コンパートメント症候群と罹患筋の組合せで正しいのはどれか。

1. 前方コンパートメント —— 長腓骨筋
2. 外側コンパートメント —— 前脛骨筋
3. 浅後方コンパートメント —— ヒラメ筋
4. 深後方コンパートメント —— 腓腹筋

はき 33-143 体調管理を目的に来院した患者に脈診をしたところ、軽く軟らかで、力なく浮いている脈がみられたが、この季節には正常な脈と判断した。この季節として適切なのはどれか。

1. 春
2. 夏
3. 秋
4. 冬

はき 33-144 筋肉がしびれてだるさがみられる病証に対し、五刺を用いて治療するときの刺法として最も適切なのはどれか。

1. 極めて浅くすばやく刺し、すばやく抜く。
2. 関節部の筋に深く刺す。
3. ニワトリの足のように分肉の間に刺す。
4. 骨に至るまで深く刺し、真っすぐに抜く。

はき 33-145 次の症例で最も適切な病証はどれか。「38 歳の男性。主訴は円形の脱毛。脱毛は急速に起こった。頭皮は脂っぽく、赤みがあり、痒みを訴える。口渇、便秘、小便黄を伴う。舌質は紅、舌苔は黄、脈は数を確認する。」

1. 血 瘀
2. 血 熱
3. 気 虚
4. 陰 虚

はき 33-146 耳鳴り・難聴に対して、循経取穴により治療する場合、最も適切なのはどれか。

1. 中 渚
2. 太 淵
3. 三 間
4. 神 門

はき 33-147 次の症例でみられる痰の性状で最も適切なのはどれか。「27 歳の男性。主訴は咳と痰。咳は無力で、声に力がない。息切れ、倦怠感を伴い、疲れると症状が悪化する。舌質は淡、舌苔は薄白、脈は弱を認める。」

1. 稀薄で透明な痰
2. 白色で大量の痰
3. 黄色く粘りのある痰
4. 血の混じった痰

はき 33-148 次の症例に対し、難経六十九難に基づき補法を行う治療穴はどれか。「82 歳の女性。主訴は尿漏れ。くしゃみをしたり、重い荷物を持ったりするときに起こる。尿の回数は多く、足腰のだるさ、倦怠感を伴う。」

1. 足臨泣
2. 曲 泉
3. 束 骨
4. 復 溜

はき 33-149 灸治療が骨盤位の矯正に効果的とされる膀胱経の要穴はどれか。

1. 井 穴
2. 榮 穴
3. 俞 穴
4. 経 穴

はき 33-150 次の症例の経脈病証はどれか。「53 歳の男性。空腹感があるが食欲がない。呼吸が苦しくせき込む。寝ることを好んで起きたがらない。」

1. 足の太陰経病証
2. 足の少陰経病証
3. 足の陽明経病証
4. 足の少陽経病証

はき 33-151 次の症例について、「46 歳の女性。夫の死をきっかけにうつ病を発症。悲観的思考となり、気力が極度に減退。食欲もなく、動悸・不眠・健忘を伴う。舌質は淡、脈は細弱を認める。」病証として最も適切なものはどれか。

1. 肝腎陰虚
2. 肝気鬱結
3. 心脾両虚
4. 脾気下陷

はき 33-152 次の症例について、「46 歳の女性。夫の死をきっかけにうつ病を発症。悲観的思考となり、気力が極度に減退。食欲もなく、動悸・不眠・健忘を伴う。舌質は淡、脈は細弱を認める。」治療の結果、食欲が出てきて、気力の減退も改善してきた。この時期に最も注意すべき症状はどれか。

1. 幻 聴
2. 観念奔逸
3. 強迫行為
4. 自殺念慮

はき 33-153 次の症例について、「65 歳の女性。右手関節部の骨折による変形が原因で、示指と中指の指先がしびれて、母指の動きが障害されるようになった。」最も認められる徴候はどれか。

1. 祈祷師の手
2. ティアドロップサイン
3. パーフェクト0の不整
4. フローマン徴候

はき 33-154 次の症例について、「65 歳の女性。右手関節部の骨折による変形が原因で、示指と中指の指先がしびれて、母指の動きが障害されるようになった。」骨折した骨として最も適切なものはどれか。

1. 舟状骨
2. 橈 骨
3. 尺 骨
4. 有鉤骨

はき 33-155 次の症例について、「35 歳の男性。インスタント麺ばかり食べている。全身がだるく、最近では下肢にしびれがみられる。膝蓋腱反射は減弱し、近医でビタミン不足と言われた。」不足しているビタミンはどれか。

1. ビタミン A
2. ビタミン B1
3. ビタミン B12
4. ビタミン D

はき 33-156 次の症例について、「35 歳の男性。インスタント麺ばかり食べている。全身がだるく、最近では下肢にしびれがみられる。膝蓋腱反射は減弱し、近医でビタミン不足と言われた。」症状改善に効果があるとされる、8 つの腧穴の組合せに含まれるのはどれか。

1. 膝陽関
2. 内膝眼
3. 陽陵泉
4. 上巨虚

はき 33-157 次の症例について、「28 歳の男性。職場でハラスメントを受けている。腹痛と下痢がひどく、出勤途中に数回トイレに行く。血便はなく、休日は症状が出ない。舌質は淡紅、舌苔は少、脈は弦を認める。」疾患として最も適切なのはどれか。

1. 胃食道逆流症
2. 潰瘍性大腸炎
3. 過敏性腸症候群
4. 機能性ディスペプシア

はき 33-158 次の症例について、「28 歳の男性。職場でハラスメントを受けている。腹痛と下痢がひどく、出勤途中に数回トイレに行く。血便はなく、休日は症状が出ない。舌質は淡紅、舌苔は少、脈は弦を認める。」治療方針として最も適切なのはどれか。

1. 肝と心の火を降ろす。
2. 肝と脾の調和を図る。
3. 肺と腎の陰液を補う。
4. 心と腎の交わりを図る。

はき 33-159 次の症例について、「52 歳の女性。右側の表情筋麻痺で来院。同側の額のしわ寄せは不能で、涙液減少、聴覚過敏、味覚障害、唾液分泌障害を伴う。」四総穴の主治を踏まえて治療する場合、最も適切な経穴はどれか。

1. 合谷
2. 列欠
3. 委中
4. 足三里

はき 33-160 次の症例について、「52 歳の女性。右側の表情筋麻痺で来院。同側の額のしわ寄せは不能で、涙液減少、聴覚過敏、味覚障害、唾液分泌障害を伴う。」後遺障害として出現の可能性が最も高いのはどれか。

1. ワニの涙
2. 眼球陥凹
3. 眼瞼下垂
4. 共同偏視

はき 32-127 頭痛の症状で施術適応となるのはどれか。

1. 突然の激しい後頭部痛とともに回転性めまい、起立困難が生じ、反復する嘔吐がみられた。
2. 早朝時の後頭部の非拍動性の慢性頭痛が週単位で増悪し、今朝は噴出性嘔吐がみられた。
3. 深夜に、流涙・鼻汁を伴う片側の眼窩周囲の激的な痛みが発作的に生じ、1時間で治まった。
4. 感冒症状が治まって2週間後に前頭部のズキズキとした痛み、熱感、叩打痛とともに後鼻漏が出現した。

はき 32-128 美容を目的に口角を上げやすくするため、大頬骨筋を刺激する経穴として最も適切なのはどれか。

1. 顴 膠
2. 巨 膠
3. 頬 車
4. 迎 香

はき 32-129 関節リウマチによる Z 変形の仏痛緩和のため局所への接触鍼を行った。施術部位の経穴として最も適切なのはどれか。

1. 魚 際
2. 二 間
3. 少 沢
4. 中 渚

はき 32-130 過活動膀胱の患者に対する治療で、脊髓排尿中枢を介した治療穴として最も適切なのはどれか。

1. 関元兪
2. 五 枢
3. 志 室
4. 中 膠

はき 32-131 C6-C7 横突起間に刺鍼することにより、治療効果が最も期待できる神経根障害によるしびれの部位はどれか。

1. 前腕橈側から母指
2. 手背中央から中指
3. 小指球から小指
4. 前腕尺側

はき 32-132 次の文で示す症例の疾患として最も適切なのはどれか。「28 歳の女性。半年前に左上腕から前腕内側にかけて痛みやしびれが出現。荷物を持つと痛みは増悪する。モーレイテスト、エデンテストともに陽性。ジャクソンテスト、スパーリングテストともに陰性。」

1. ギヨン管症候群
2. 頸椎症性脊髄症
3. 頸椎症性神経根症
4. 胸郭出口症候群

はき 32-133 次の文で示す症例で、病態把握を目的に実施する徒手検査法はどれか。「50 歳の女性。主訴は右手関節橈側の痛みと腫脹。最近家事が忙しく徐々に症状が出現し、特に母指を動かすと強い仏痛がある。」

1. チェアテスト
2. トムゼンテスト
3. ファレンテスト
4. アイヒホッフテスト

はき 32-134 次の文で示す症例の施術対象となる神経根で最も適切なのはどれか。「26 歳の男性。3 か月前から左腰下肢の痛みを自覚するようになった。左のアキレス腱反射減弱と足部外縁から足底にかけての感覚鈍麻を認める。」

1. L3
2. L4
3. L5
4. S1

はき 32-135 次の文で示す症例の罹患筋として最も適切なのはどれか。「45 歳の女性。半年前から右手の母指・示指掌側にしびれがあり、母指球の萎縮と祈祷師の手を認める。」

1. 斜角筋
2. 小胸筋
3. 円回内筋
4. 尺側手根屈筋

はき 32-136 次の文で示す症例で運動療法の対象となる筋の疲労緩和を目的に腹臥位で施術を行う場合、局所治療穴として最も適切なのはどれか。「62 歳の女性。主訴は膝関節痛。内反膝と大腿前面の筋萎縮がみられたため、患者にパテラセティングを行わせた。」

1. 委 中
2. 承 扶
3. 風 市
4. 膝陽関

はき 32-137 次の文で示す症例で拘縮がみられる可能性が最も高い筋はどれか。「68 歳の女性。変形性股関節症による左股関節痛があり、トーマステスト陽性。恥骨結合下縁の高さで縫工筋のすぐ外方陥凹部にある筋に顕著な圧痛がある。エリーテスト陽性。」

1. 大腿筋膜張筋
2. 大腿直筋
3. 長内転筋
4. 恥骨筋

はき 32-138 次の文で示す症例でみられるのはどれか。「70 歳の女性。数年前から動作緩慢になり、現在は丸薬丸め運動も出現してきた。」

1. 無汗症
2. 歯車現象
3. ガワーズ徴候
4. ホフマン反射陽性

はき 32-139 顎関節症に対する局所治療穴とその対象となる筋の組合せで最も適切なのはどれか。

1. 禾 膠 —— 咬 筋
2. 瘰 脈 —— 側頭筋
3. 下 関 —— 外側翼突筋
4. 懸 顱 —— 内側翼突筋

はき 32-140 改訂長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）にはなく、MMSE にある評価項目はどれか。

1. 計 算
2. 図形模写
3. 時間の見当識
4. 単語の直後再生

はき 32-141 後骨間神経麻痺で生じるのはどれか。

1. 猿 手
2. 鷲 手
3. 下垂指
4. 尺側偏位

はき 32-142 三叉神経第2枝の神経痛に対する局所治療穴として適切なのはどれか。

1. 曲 差
2. 陽 白
3. 四 白
4. 大 迎

はき 32-143 六部定位脈診で右手寸口の沈が虚している場合、難経六十九難に基づく配穴で適切なのはどれか。

1. 太淵と太白
2. 復溜と経渠
3. 曲泉と陰谷
4. 大都と少府

はき 32-144 取穴部位が主治症の局所にある奇穴はどれか。

1. 寝違えに対する落枕
2. 腹痛に対する胆囊点
3. 腰痛に対する腰痛点
4. 足背痛に対する八風

はき 32-145 次の文で示す病証に対する治療方針として最も適切なのはどれか。「56歳の男性。職場の人間関係のストレスから不眠となり、動悸も感じている。最近は物忘れや腰下肢の重だるさ、歯のぐらつきもある。舌質は紅、脈は数を認める。」

1. 肝血を補う。
2. 腎陽を補う。
3. 心火を除く。
4. 肝陽を降ろす。

はき 32-146 右足の第1趾と第2趾に慢性的な痛みがある患者に対し、表裏する経脈を同時に治療する目的で用いる要穴として最も適切なのはどれか。

1. 行 間
2. 公 孫
3. 衝 陽
4. 中 都

はき 32-147 足陽明経の経脈病証でみられるのはどれか。

1. 口が歪む。
2. 口が苦い。
3. 口が乾く。
4. 口が熱い。

はき 32-148 次の文で示す病証に対する十二刺として最も適切なのはどれか。「45歳の男性。仕事のストレスでのぼせ感が続く。最近はいらいらして気持ちがたかぶり眠れない日が多くなっている。舌尖は紅、脈は数で有力を認める。」

1. 輪 刺
2. 陰 刺
3. 斉 刺
4. 揚 刺

はき 32-149 次の文で示す病証に対する治療方針として最も適切なのはどれか。「51歳の男性。主訴は動悸。特に食後に起こることが多い。胸悶、息切れを伴う。腹診では胃部振水音を認めた。」

1. 血を補う。
2. 陰液を補う。
3. 痰湿を除く。
4. 瘀血を除く。

はき 32-150 次の文で示す病証の状態として最も適切なのはどれか。「52歳の男性。日頃から辛い物やアルコールを摂り過ぎたため、口渇が強く、みぞおちに灼熱感があつた。その後、空腹感はあるが食が進まなくなってきた。舌質は紅、無苔、脈は細数を認める。」

1. 胃熱が血を滞らせている。
2. 胃熱が胃の津液を損傷している。
3. 湿熱が疏泄機能を障害している。
4. 湿熱が膀胱を熱化させている。

はき 32-151 次の文で示す症例について、問いに答えよ。「50歳の男性。主訴は食欲不振。急な腹痛や嘔気があり、病院で胃の出血性びらんを指摘され、飲酒を控えるように言われた。口が苦く、舌質は紅、舌苔は厚膩、脈は滑数を認める。」腹痛が最も認められる部位はどれか。

1. 心窩部
2. 臍 部
3. 側腹部
4. 下腹部

はき 32-152 次の文で示す症例について、問いに答えよ。「50 歳の男性。主訴は食欲不振。急な腹痛や嘔気があり、病院で胃の出血性びらんを指摘され、飲酒を控えるように言われた。口が苦く、舌質は紅、舌苔は厚膩、脈は滑数を認める。」治療方針として最も適切なのはどれか。

1. 肝気を通す。
2. 湿熱を除く。
3. 脾気を補う。
4. 胃陰を補う。

はき 32-153 次の文で示す症例について、問いに答えよ。「45 歳の女性。職業は美容師。主訴は右上肢全体の持続的なだるさ。腱反射は正常。ライトテストは陽性。ジャクソンテスト、アドソンテストはともに陰性。」病態について最も適切なのはどれか。

1. 血流障害はない。
2. 握力低下はない。
3. 髪をカットする姿勢で症状誘発。
4. 空を見上げると症状誘発。

はき 32-154 次の文で示す症例について、問いに答えよ。「45 歳の女性。職業は美容師。主訴は右上肢全体の持続的なだるさ。腱反射は正常。ライトテストは陽性。ジャクソンテスト、アドソンテストはともに陰性。」罹患筋への局所治療を行う場合、適切な経穴はどれか。

1. 中 府
2. 肩外兪
3. 巨 骨
4. 扶 突

はき 32-155 次の文で示す病証について、問いに答えよ。「34 歳の女性。不妊症で来院。月経量は少なく、経遅がある。少し動いただけで短気が生じ、四肢厥冷もある。最近はや腰膝酸軟を伴う。舌は淡で胖大、脈は沈遅を認める。」本病証に最も随伴しやすいのはどれか。

1. 五更泄瀉
2. 消穀善飢
3. 項背強
4. 目 渋

はき 32-156 次の文で示す病証について、問いに答えよ。「34 歳の女性。不妊症で来院。月経量は少なく、経遅がある。少し動いただけで短気が生じ、四肢厥冷もある。最近はや腰膝酸軟を伴う。舌は淡で胖大、脈は沈遅を認める。」本病証の治療穴として最も適切な背部兪穴の高さはどれか。

1. 第3胸椎棘突起下縁
2. 第9胸椎棘突起下縁
3. 第12胸椎棘突起下縁
4. 第2腰椎棘突起下縁

はき 32-157 次の文で示す症例について、問いに答えよ。「52 歳の男性。3 週間前に風邪を引き、現在も咳と軽度な息切れが残っている。近医で喘息と言われ気管支拡張剤を処方された。」気管支拡張剤が作用する受容体はどれか。(解答 2 つ)

1. ニコチン受容体
2. ムスカリン受容体
3. a 受容体
4. b 受容体

はき 32-158 次の文で示す症例について、問いに答えよ。「52 歳の男性。3 週間前に風邪を引き、現在も咳と軽度な息切れが残っている。近医で喘息と言われ気管支拡張剤を処方された。」気管支拡張剤が作用する受容体はどれか。本症例に対して奇穴を取穴する際、仮点を求めるために委中を用いるのはどれか。

1. 四 華
2. 患 門
3. 定 喘
4. 夾 脊

はき 32-159 次の文で示す症例について、問いに答えよ。「69 歳の男性。主訴は両側の耳鳴り。3 か月前から高音域の聴力低下を自覚。相手の言葉が聞き取りにくい。めまい、耳閉塞感、耳漏はない。」難聴の程度を評価する検査はどれか。

1. リンネ検査
2. オージオメトリー
3. グリセロール検査
4. カロリックテスト

はき 32-160 次の文で示す症例について、問いに答えよ。「69 歳の男性。主訴は両側の耳鳴り。3 か月前から高音域の聴力低下を自覚。相手の言葉が聞き取りにくい。めまい、耳閉塞感、耳漏はない。」原因疾患として最も適切なのはどれか。

1. 加齢性難聴
2. 慢性中耳炎
3. 突発性難聴
4. 耳管狭窄症

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 31) 東洋医学臨床論	127～150
-----------------	---------

はき 31-127 医療面接の態度について最も適切なのはどれか。

1. 患者の正面に座る。
2. 患者の話を共感的に聴く。
3. 導入は閉ざされた質問から行う。
4. アドヒアランスよりコンプライアンスを目指す。

はき 31-128 腰椎前弯の増強を改善する目的で行う体操はどれか。

1. コッドマン体操
2. バージャー体操
3. フレンケル体操
4. ウィリアムス体操

はき 31-129 左手中指のしびれを訴える患者に第 6 ・ 第 7 頸椎棘突起間の左外方に刺鍼し症状が改善した。本症例の検査所見として最も適切なのはどれか。

1. ファレンテスト陽性
2. 上腕三頭筋反射減弱
3. 中指伸展テスト陽性
4. エデンテスト陽性

はき 31-130 次の文で示す症例で障害神経根として最も適切なのはどれか。「45 歳の男性。荷物の搬送中に腰に激痛が走り、右下肢に痛みが生じている。近医にて腰椎椎間板ヘルニアと診断された。しゃがんだ状態から立ち上がる際に右膝の力が入らない。」

1. L4
2. L5
3. S1
4. S2

はき 31-131 上後腸骨棘と大転子近位端を結んだ線の中点から垂直下方に 1 ～ 2 横指下がったところを局所刺鍼点とすべき疾患で、陽性となる徒手検査法として最も適切なのはどれか。

1. エリーテスト
2. パトリックテスト
3. フライバーグテスト
4. ボンネットテスト

はき 31-132 アレルギー性鼻炎について正しいのはどれか。

1. 他のアレルギー疾患は随伴しない。
2. 粘液性の鼻汁がみられる。
3. 片側性鼻閉が主となる。
4. 鼻腔内の痒みを認めることが多い。

はき 31-133 末梢神経麻痺における罹患神経と麻痺筋の組合せで正しいのはどれか。

1. 橈骨神経 ————— 円回内筋
2. 正中神経 ————— 母指内転筋
3. 尺骨神経 ————— 掌側骨間筋
4. 肩甲上神経 ————— 僧帽筋

はき 31-134 糖尿病性末梢神経障害に特徴的な所見はどれか。

1. 両側内果の振動覚低下
2. 宙吊り型の解離性感覚障害
3. 下肢から上行性に広がる弛緩性麻痺
4. しびれより筋力低下が顕著な上肢の神経障害

はき 31-135 次の文で示す症例で将来起こりうる徴候はどれか。「生後 6 か月の乳児。仰臥位で寝かせたときに右の大腿皮膚溝が左と比べて数が多く、深く、長い。右股関節の開排制限もある。」

1. アリス徴候
2. ガワーズ徴候
3. レルミット徴候
4. ロンベルグ徴候

はき 31-136 次の文で示す症例で最も適切な所見はどれか。「40 歳の女性。半年前から回転性のめまい発作に苦む。耳鳴り、難聴、耳閉塞感が生じる。悪心・嘔吐を伴うこともある。カロリックテスト陰性。」

1. 失調性歩行がみられる。
2. 難聴は感音性である。
3. グリセロール検査は陰性である。
4. 特定の頭位でめまい発作が生じる。

はき 31-137 高齢者に対する評価法とその内容の組合せで最も適切なのはどれか。

1. タイムドアップアンドゴーテスト-主観的 QOL
2. ファンクショナルリーチテスト-ADL
3. バーセル・インデックス-立位動的バランスの状態
4. ロコモ度テスト-年齢相応の移動能力

はき 31-138 次の文で示す症例で考えられる疾患はどれか。「65 歳の女性。軽度の肥満。主訴は膝痛。膝の内側が動作開始時や疲労時に痛む。膝のロッキングはみられない。」

1. 腸脛靭帯炎
2. 内側滑膜ひだ障害（タナ障害）
3. 変形性膝関節症
4. 膝蓋靭帯炎

はき 31-139 次の文で示す症例で障害筋への局所治療穴として最も適切なのはどれか。「53 歳の男性。最近、長時間歩くと、足がつる。今朝は、ウォーキング中に母指が屈曲する筋けいれんとともに下腿後面の深部に仏痛が生じたが、しばらく休むと軽快した。」

1. 飛 揚
2. 膝 関
3. 合 陽
4. 外 丘

はき 31-140 詐病が疑われる腰痛患者に対して、坐位で膝を他動的に伸展させるのはどれか。

1. ケンプ徴候
2. サギング徴候
3. フリップ徴候
4. ブラガードテスト

はき 31-141 こめかみがズキズキする頭痛に対して九刺の遠道刺を用いて治療する場合、最も適切な経穴はどれか。

1. 頷 厭
2. 太 陽
3. 合 谷
4. 陽陵泉

はき 31-142 命門火衰により冷えを訴える患者に対し、臓腑を考慮して施灸する場合、最も適切な経穴はどれか。

1. 太 淵
2. 神 門
3. 太 溪
4. 衝 陽

はき 31-143 次の文で示す病証が進行した場合、みられやすい症状はどれか。「39 歳の女性。主訴は眼精疲労。長時間のデスクワークで目がかすむ。日頃から眠りが浅く、爪の血色が悪い。舌苔は薄白、脈は細数を帯びてきた。」

1. 消 渴
2. 盜 汗
3. 厭 食
4. 譫 語

はき 31-144 次の文で示す病証で最も適切なのはどれか。「31 歳の男性。主訴は悪心・嘔吐。業務の繁忙とともに食欲がなくなり、上腹部の膨満感、胸脇部の脹痛を自覚するようになった。精神的な緊張によって嘔気が頻回に起こる。脈は弦を認める。」

1. 気虚証
2. 気陷証
3. 気脱証
4. 気逆証

はき 31-145 次の文で示す病証に対する治療方針として最も適切なのはどれか。「49 歳の男性。主訴は食欲不振。空腹感はあるが多くは食べられない。胃脘部に我慢できる程度のはっきりしない痛みがある。舌質は紅を認める。」

1. 陰液を補う。
2. 陽気を補う。
3. 気滞を除く。
4. 湿熱を除く。

はき 31-146 次の文で示す臓腑病証に対し、その郄穴に迎随の補瀉に基づき斜刺する場合、鍼尖の方向にある経穴として適切なのはどれか。「30 歳の男性。 3 日前に愛車に落書きをされて怒りが収まらず、顔面の痛みとのぼせも出てきた。夜も眠れず目が赤い。舌質は紅、脈は弦数を認める。」

1. 蠡 溝
2. 膝 関
3. 承 山
4. 条 口

はき 31-147 次の文で示す病証でみられる痛みの性質はどれか。「53 歳の男性。主訴は肩関節痛。過労により食欲減退が続き、倦怠感とともに肩が痛みだした。痛みは慢性に経過し、息切れ、自汗を伴う。舌質は淡、舌苔は薄白、脈は細弱を認める。」

1. 隠 痛
2. 刺 痛
3. 脹 痛
4. 重 痛

はき 31-148 膀胱湿熱でみられるのはどれか。

1. 遺 尿
2. 癰 閉
3. 余 瀝
4. 小便自利

はき 31-149 次の文で示す病証を八脈交会穴を用いて治療する場合、取穴部位として正しいのはどれか。「帯下があり、腹部の皮膚のかゆみ、下腿前側のひきつりがみられる。」

1. 足背、第 4 ・第 5 中足骨底接合部の遠位
2. 足外側、外果尖の直下
3. 足内側、内果尖の下方 1 寸
4. 足内側、第 1 中足骨底内側の遠位陥凹部

はき 31-150 次の文で示す病証の治療方針として最も適切なのはどれか。「47 歳の女性。最近よく口渇を感じるが、水分は口を潤す程度で少量しか飲めない。手足の皮膚が伸肌になってきた。舌質は紫暗、脈は澀を認める。」

1. 風邪を除く。
2. 瘀血を除く。
3. 痰湿を除く
4. 気滞を除く。

はき 31-151 「47 歳の女性。頭痛が続き、いらだちがある。耳鳴りもあり受診した。口苦があり、睡眠が浅い。昨年に閉経。舌は紅、脈は弦数、腹は胸脇苦満を認める。」内分泌検査で血中濃度が基準値より高いのはどれか。

1. バソプレシン
2. ギナドトロピン
3. エストラジオール
4. プロスタグランジン

はき 31-152 「47 歳の女性。頭痛が続き、いらだちがある。耳鳴りもあり受診した。口苦があり、睡眠が浅い。昨年に閉経。舌は紅、脈は弦数、腹は胸脇苦満を認める。」病証として最も適切なのはどれか。

1. 腎気虚
2. 心脾両虚
3. 心腎不交
4. 肝火亢進

はき 31-153 「40 歳の男性。右腰下肢が痛み、右足部外側にしびれがある。アキレス腱反射減弱、下肢伸展挙上テスト陽性。」施術対象となる神経根として最も適切なのはどれか。

1. L3
2. L4
3. L5
4. S1

はき 31-154 「40 歳の男性。右腰下肢が痛み、右足部外側にしびれがある。アキレス腱反射減弱、下肢伸展挙上テスト陽性。」筋力が最も低下する筋はどれか。

1. 中殿筋
2. 前脛骨筋
3. 大腿四頭筋
4. 長母指屈筋

はき 31-155 「47 歳の女性。主訴は左顔面の麻痺。2 週間前に腹痛、下腿前面の痛みとともに発症。現在は下腿内側の重だるさ、軟便を伴う。」原絡表裏配穴法で主証に対応する経穴の部位にあるのはどれか。

1. 足背動脈
2. 後脛骨動脈
3. 母指外転筋腱
4. 前脛骨筋腱

はき 31-156 「47 歳の女性。主訴は左顔面の麻痺。 2 週間前に腹痛、下腿前面の痛みとともに発症。現在は下腿内側の重だるさ、軟便を伴う。」発症から 4 か月後、口輪筋を収縮させると左の眼輪筋も収縮する病的共同運動が出現した。両筋に対して 30 mm のステンレス鍼で鍼通電療法を行う場合、最も適切なのはどれか。

1. 20 号鍼を用いる。
2. 鍼体はすべて刺入する。
3. 周波数は 1 Hz とする。
4. 両筋が同期的リズムで収縮するように通電する。

はき 31-157 「18 歳の女性。新体操の選手で毎日の激しい練習と無理なダイエットをしていたら月経が止まった。近医で、利用できるエネルギー不足が原因の運動性無月経と言われた。」同じ原因で起こる合併症として最も考えられるのはどれか。

1. 子宮筋腫
2. 骨粗鬆症
3. 円形脱毛症
4. 過敏性腸症候群

はき 31-158 「18 歳の女性。新体操の選手で毎日の激しい練習と無理なダイエットをしていたら月経が止まった。近医で、利用できるエネルギー不足が原因の運動性無月経と言われた。」無月経に対し、胞宮から起こる経脈に治療する場合、最も適切な奇経はどれか。

1. 衝 脈
2. 帶 脈
3. 陰維脈
4. 陰蹻脈

はき 31-159 「40 歳の女性。仕事でパソコン作業が多く、午後から締め付けられるような両側性の頭痛を発症する。頭痛は非拍動性で悪心・嘔吐はない。飲酒で増悪しない。」考えられる疾患はどれか。

1. 片頭痛
2. 群発頭痛
3. 緊張型頭痛
4. 三俎神経・自律神経性頭痛

はき 31-160 「40 歳の女性。仕事でパソコン作業が多く、午後から締め付けられるような両側性の頭痛を発症する。頭痛は非拍動性で悪心・嘔吐はない。飲酒で増悪しない。」生活指導で最も適切なのはどれか。

1. 入浴はシャワーのみで済ませる。
2. 枕の高さは今よりも高くする。
3. 後頸部をホットタオルで温める。
4. パソコン作業では同一姿勢を維持する。

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 30) 東洋医学臨床論	127～150
-----------------	---------

はき 30-127 緊張型頭痛に対する局所治療について罹患筋と治療穴の組合せで正しいのはどれか。

1. 側頭筋 ——— 風 池
2. 僧帽筋 ——— 翳 風
3. 後頭筋 ——— 玉 枕
4. 頭半棘筋 ——— 脳 空

はき 30-128 マン・ウェルニッケ肢位にある片麻痺患者に対して、上肢の痙性の改善を目的に相反性 Ia 抑制を応用した低周波鍼通電療法を行う場合、適切な治療穴の組合せはどれか。

1. 消 瀾 ——— 外 関
2. 曲 沢 ——— 内 関
3. 承 筋 ——— 承 山
4. 豊 隆 ——— 足三里

はき 30-129 次の文で示す症例の障害神経根の部位で最も適切なのはどれか。

「55 歳の男性。頸部の神経根症状により左肩関節外転筋力低下、左上腕二頭筋反射減弱、左上腕外側の知覚鈍麻がみられる。」

1. C3 - C4 間
2. C4 - C5 間
3. C6 - C7 間
4. C7 - Th1 間

はき 30-130 次の文で示す症例に対する局所治療穴として最も適切なのはどれか。

「38 歳の女性。家事や子どもの世話が忙しく、最近になって手関節に痛みを感じるようになった。アイヒホッフテスト陽性。」

1. 内 関
2. 合 谷
3. 列 欠
4. 陽 池

はき 30-131 顎関節症患者に対して下顎骨の前方移動の作用がある筋を刺激する場合、最も適切なのはどれか。

1. 下 関
2. 牽 正
3. 大 迎
4. 太 陽

はき 30-132 次の文で示す症例で罹患神経に対する治療穴として最も適切なのはどれか。

「35 歳の女性。妊娠に伴い母指から中指にかけてしびれが出現し、母指と示指で輪を作ろうとすると楕円型になる。」

1. 小 海
2. 手五里と足五里
3. 天 井
4. 内 関

はき 30-133 末梢性顔面神経麻痺で過誤再生による後遺症はどれか。

1. 兔 眼
2. ワニの涙
3. 味覚脱失
4. 聴覚過敏

はき 30-134 頭部の神経痛と局所治療穴の組合せで正しいのはどれか。

1. 三叉神経痛（第1 枝）—— 太 陽
2. 大後頭神経痛 —— 完 骨
3. 小後頭神経痛 —— 天 柱
4. 大耳介神経痛 —— 瘰 脈

はき 30-135 サルコペニアの症状はどれか。

1. 知人の名前が思い出せなくなってきた。
2. 油っこいものを食べることが減ってきた。
3. 歩くスピードが遅くなってきた。
4. 夜間のトイレの回数が多くなってきた。

はき 30-136 次の文で示す症例で、鍼口治療の効果を評価するのに最も適切なのはどれか。

「65 歳の女性。1 年前から生活に充実感がなく、気持ちが沈む。倦怠感、食欲不振を伴う。幻覚や記憶障害はない。」

1. 改訂長谷川式簡易知能評価スケール
2. タイムドアップアンドゴーテスト
3. バーセル・インデックス
4. ハミルトン評価尺度

はき 30-137 次の文で示す症例の治療対象となる筋で最も適切なのはどれか。

「40 歳の女性。運動不足解消のためテニスを始めたところ、バックハンドストロークの際に肘の痛みを自覚するようになった。」

1. 短橈側手根伸筋
2. 尺側手根屈筋
3. 腕橈骨筋
4. 円回内筋

はき 30-138 スポーツ障害と罹患筋に対する治療穴の組合せで最も適切なのはどれか。

1. 上腕二頭筋長頭腱炎 ————— 肩 髂
2. 肩インピンジメント症候群 ——— 肩外俞
3. ジャンパー膝 ————— 鶴 頂
4. シンスプリント ————— 蘭 尾

はき 30-139 次の文で示す病態により生じたスポーツ外傷・障害に対する検査法はどれか。

「膝関節の屈伸動作時に、ある組織が大腿骨外側上顆で繰り返し摩擦を生じる一種の使い過ぎ症候群である。」

1. エリーテスト
2. グラスピングテスト
3. マクマレーテスト
4. 膝内反ストレステスト

はき 30-140 次の文で示す症例に対する罹患筋への局所治療穴として適切なのはどれか。

「17 歳の男子。陸上部で長距離走をしている。ランニングを開始すると下腿前方に痛みと腫れが出るが、数十分の安静で症状が消失する。近医で前方コンパートメント症候群と言われた。」

1. 小腸の下合穴
2. 膀胱の下合穴
3. 三焦の下合穴
4. 胆の下合穴

はき 30-141 次の文で示す刺法はどれか。

「寒気の浅いとき、皮膚をつまんで引っ張りこれを刺す。」

1. 直鍼刺
2. 斉 刺
3. 傍鍼刺
4. 揚 刺

はき 30-142 次の文で示す病証に対する治療方針として最も適切なのはどれか。

「43 歳の女性。主訴は膝の痛み。1 週間雨天が続き、症状が増悪している。昨日てんぷらを食べてから軟便である。舌は膩苔、脈は滑を認める。」

1. 逆気を降ろす。
2. 血をめぐらせる。
3. 気血を補う。
4. 痰湿を除く。

はき 30-143 次の文で示す病証として適切なのはどれか。

「32 歳の女性。主訴は眼精疲労。最近、月経血の量が少なく色も薄くなった。緊張すると手がふるえ、夜中にこむら返りが起こりやすい。舌は淡白、脈は澹を認める。」

1. 心血虚
2. 腎精不足
3. 脾不統血
4. 肝血虚

はき 30-144 次の文で示す病証で随伴症状として最もみられるのはどれか。

「27 歳の男性。主訴は便秘。暑がりによく汗をかき、便は硬く乾燥している。腹部膨満、口臭、顔面紅潮を伴う。舌は紅、黄燥苔、脈は実を認める。」

1. 脱 肛
2. 煩 躁
3. 口 淡
4. 小便清長

はき 30-145 次の文で示す経脈病証で障害されている経脈の同名経を施術する場合、最も適切な治療穴はどれか。

「72 歳の男性。3 日前から急に腰が痛くなり、身体を反らすことができなくなった。陰囊の脹痛、胸満、遺尿もみられる。」

1. 靈 道
2. 陽 谷
3. 支 溝
4. 間 使

はき 30-146 次の文で示す病証に対する治療方針で最も適切なのはどれか。

「22 歳の女性。主訴は月経痛。経血量は少なく、血塊が混じることがある。小腹部の冷痛と拒按がみられ、足が冷える。舌根に白厚苔、脈は沈遅を認める。」

1. 肝鬱を抑える。
2. 寒邪を除く。
3. 脾の統血を促す。
4. 肝腎の精血を補う。

はき 30-147 次の文で示す病証に対する治療穴で最も適切なのはどれか。

「33 歳の男性。主訴は上腹部の不快感。連日、飲食の不摂生が続き、悪心、嘔吐がみられる。腹部膨満、噯気、口臭を伴う。舌は厚苔、脈は滑実を認める。」

1. 膻 中
2. 梁 門
3. 帶 脈
4. 盲 兪

はき 30-148 次の文で示す病証で最も適切なのはどれか。

「58 歳の女性。昨夜から陰部掻痒感を自覚。最近イライラすることが多く、飲酒量が増えた。舌辺に黄厚膩苔、脈は左関上の浮数滑を認める。」

1. 胃陰虚
2. 胃 熱
3. 肝経湿熱
4. 肝陽上亢

はき 30-149 次の文で示す病証に対する治療穴で最も適切なのはどれか。

「46 歳の女性。昨晚急なめまい発作があった。最近怒りっぽくなり、胸脇部の張り感がある。脈は弦を認める。」

1. 地 機
2. 中 都
3. 水 泉
4. 金 門

はき 30-150 次の文で示す病証に対する経脈を考慮した治療穴として適切なのはどれか。

「65 歳の男性。2 日前に新型コロナワクチン接種を受けたところ、肩を外転すると強い痛みを自覚する。悪寒、発熱、頭痛はない。肩の屈曲、伸展痛もない。」

1. 魚 際
2. 天 泉
3. 液 門
4. 前 谷

次の文で示す症例について、はき 30-151、はき 30-152 の問いに答えよ。

「25 歳の男性。3 か月前から膨満感を伴う上腹部痛、嘔気が続く。症状はストレスで増悪、嘔気で軽快する。下痢はない。舌は薄黄苔、脈は弦を認める。」

はき 30-151 病証として最も適切なのはどれか。

1. 肝胃不和
2. 肝脾不和
3. 脾腎陽虚
4. 脾胃湿熱

はき 30-152 上腹部痛の性質として最も適切なのはどれか。

1. 酸 痛
2. 脹 痛
3. 重 痛
4. 隠 痛

次の文で示す症例について、はき 30-153、はき 30-154 の問いに答えよ。

「26 歳の女性。なで肩で痩せている。主訴は右上肢全体の持続的なだるさ。□反射は正常、スパーリングテスト、エデンテスト、ライトテストは陰性、アドソンテストは陽性。」

はき 30-153 進行した際の症状として最も適切なのはどれか。

1. レイノー現象
2. 筋トーマス亢進
3. 筋線維束性れん縮
4. 手指巧緻運動障害

はき 30-154 罹患筋への局所治療穴として適切なのはどれか。

1. 屋 翳
2. 気 戸
3. 胸 郷
4. 天 鼎

次の文で示す症例について、はき 30-155、はき 30-156 の問いに答えよ。

「32 歳の女性。主訴は月経時の下腹部および腰の痛み。主訴の部位と手足の冷えを伴い、温めると改善する。月経血は暗紫色で血塊が混じる。婦人科では機能性月経困難症と診断された。」

はき 30-155 最もみられる脈状はどれか。

1. 浮 緊
2. 滑 数
3. 遅 瀼
4. 細無力

はき 30-156 デルマトームを考慮した治療を行う場合、最も適切な経穴はどれか。

1. 膈 兪
2. 腎 兪
3. 足三里
4. 三陰交

次の文で示す症例について、はき 30-157、はき 30-158 の問いに答えよ。

「62 歳の女性。主訴は腰痛。立位で腰椎の前弯が強く、骨盤が前傾している。膝関節のアライメントの異常はみられなかった。」

はき 30-157 伸長し弱化している筋として最も適切なのはどれか。

1. 大殿筋
2. 大腰筋
3. 大腿直筋
4. 大腿筋膜張筋

はき 30-158 伸長し弱化している筋への局所治療穴として最も適切なのはどれか。

1. 居 髎
2. 衝 門
3. 髀 関
4. 胞 育

次の文で示す症例について、はき 30-159、はき 30-160 の問いに答えよ。

「60 歳の男性。主訴は足のむくみ。近医で乏尿ではないが、尿量が少ないと指摘された。残尿感はない。下痢しやすい。舌は胖嫩、齒痕、白厚膩苔、脈は滑を認める。」

はき 30-159 治療すべき臓腑はどれか。

1. 脾
2. 心
3. 肝
4. 膀胱

はき 30-160 適切な治療穴はどれか。

1. 尺側手根屈筋腱の橈側縁、手関節掌側横紋の上方 1 寸
2. 第 1 中足骨底内側の遠位陥凹部、赤白肉際
3. 脛骨内側面の中央、内果尖の上方 5 寸
4. 腓腹筋外側頭下縁とアキレス腱の間、崑崙の上方 7 寸

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 29) 東洋医学臨床論	127～150
-----------------	---------

はき 29-127 鍼施術で気胸を起こすリスクが最も高い経穴はどれか。

1. 天 宗
2. 身 柱
3. 附 分
4. 三焦俞

はき 29-128 次の文で示す異常歩行に対して筋萎縮の予防を目的に低周波鍼通電療法を行う場合、治療穴の組合せとして適切なのはどれか。「つま先が上がりにくく、膝を高く上げた後、つま先から接地するように歩く。」

1. 伏 兔 ————— 陰 市
2. 委 中 ————— 承 山
3. 地 機 ————— 三陰交
4. 足三里 ————— 下巨虚

はき 29-129 次の文で示す症例に対する生活指導で最も適切なのはどれか。

「32 歳の女性。頸は細く、なで肩。長時間のパソコン作業で肩こりに続き、持続性の鈍痛が後頭部に出現。仕事を休むほどではない。悪心・嘔吐、光過敏は伴わない。」

1. パソコン作業時は肘掛けの使用を控える。
2. 後頸部の筋群の筋力トレーニングを行わせる。
3. 入浴はシャワーのみで済ませる。
4. 現在より高さのある枕を使用させる。

はき 29-130 特発性三叉神経痛の好発部位に対する局所治療穴として最も適切なのはどれか。

1. 陽 白
2. 四 白
3. 印 堂
4. 魚 腰

はき 29-131 過活動膀胱の患者に対する治療で、仙髄排尿中枢を介した治療穴として最も適切なのはどれか。

1. 水 分
2. 三焦俞
3. 腎 俞
4. 中 髎

はき 29-132 次の文で示す症例で罹患神経の絞扼部位に対する刺鍼部位として最も適切なのはどれか。

「33 歳の女性。主訴は右手掌の母指から環指橈側にかけての痛みとしびれ。妊娠中に発症し、出産後、家事と育児で症状が増悪し、物がつまみにくくなった。」

1. 肘頭と上腕骨外側上顆の間
2. 肘頭と上腕骨内側上顆の間
3. 橈側手根隆起と尺側手根隆起の間
4. 豆状骨と有鉤骨鉤の間

はき 29-133 L4-L5 間の後外側への椎間板ヘルニアによる下肢の痛みに対する局所治療穴として最も適切なのはどれか。

1. 承 筋
2. 陰 谷
3. 地 機
4. 足三里

はき 29-134 次の文で示す症例の拘縮がみられる筋に対する局所治療穴として最も適切なのはどれか。

「73 歳の女性。主訴は左股関節の痛み。3 か月前から痛みがひどくなった。エックス線検査にて軟骨下骨の硬化、骨棘形成がみられた。トーマステストは陽性、トレンデレンブルグ徴候とエリーテストは陰性。」

1. 居 髎
2. 衝 門
3. 秩 辺
4. 髀 関

はき 29-135 次の文で示す症例の神経絞扼部に対する刺鍼部位として最も適切なのはどれか。

「28 歳の女性。職業は鍼灸師。回外位で左前腕にカバンを引っかけて持つことが多く、内側上顆から肘窩内側縁に沿った張り感とともに左手掌橈側にしびれを自覚する。最近、左手で艾を捻ることが困難である。」

1. 孔最と少海の間
2. 曲池と曲沢の間
3. 間使と大陵の間
4. 手三里と支正の間

はき 29-136 次の文で示す症例の罹患筋に対する刺鍼部位として最も適切なのはどれか。「20 歳の男性。右利き投手。オーバースロー投球時のコッキング期に右肩峰の前下方に痛みが出る。インピンジメントテスト陽性。」

1. 秉 風
2. 肩 貞
3. 天 宗
4. 肩外兪

はき 29-137 次の文で示す症例の原因となる筋への治療穴として最も適切なのはどれか。

「13 歳の男子。サッカーをしており、最近になり膝前下部の運動時痛と腫脹が認められた。」

1. 髌 関
2. 箕 門
3. 豊 隆
4. 三陰交

はき 29-138 スポーツ障害と罹患筋に対する局所治療穴の組合せで適切なのはどれか。

1. シンスプリント ————— 三陰交
2. ジャンパー膝 ————— 足三里
3. フォアハンドテニス肘 ————— 曲 池
4. 野球肩 ————— 雲 門

はき 29-139 次の文で示す患者の病証に対し、八脈交会穴の配穴に基づき、手関節近傍の経穴に刺鍼した。もう一か所の刺鍼部位として最も適切なのはどれか。「50 歳の男性。主訴は上腹部痛。胸やけと悪心もある。」

1. 足内側、第 1 中足骨底内側の遠位陥凹部
2. 足内側、内果尖の下方 1 寸
3. 足背、第 4・第 5 中足骨底接合部の遠位
4. 足外側、外果尖の直下

はき 29-140 脾の運化作用を介して湿を除くことにより治療できる痛みはどれか。

1. 脹 痛
2. 重 痛
3. 刺 痛
4. 隠 痛

はき 29-141 次の文で示す患者に対し、八会穴を用いて治療を行う場合、膈俞とともに選穴するのはどれか。「47 歳の女性。2 か月前からめまいがあり、頭部 MRI 検査では異常はなかった。疲れやすく、風邪を引きやすい。爪の色が薄く、経血量の減少がある。舌は淡、脈は弱を認める。」

1. 大 杼
2. 膻 中
3. 陽陵泉
4. 懸 鍾

はき 29-142 次の文で示す患者の病証に対する治療方針として最も適切なのはどれか。

「65 歳の男性。1 か月前から腰下肢のだるさがあり、最近では耳鳴りが断続的に起こる。舌は紅、脈は細数を認める。」

1. 肺陰を補う。
2. 腎陰を補う。
3. 肝陽を補う。
4. 脾陽を補う。

はき 29-143 次の文で示す患者の病証に対する治療方針として最も適切なのはどれか。

「36 歳の女性。主訴は咳嗽。せき込むと粘稠で白色の痰を多量に喀出する。緩解と増悪を繰り返しながら 3 年が経過している。子どもの頃から食が細く、痩せている。舌は淡、白膩苔、脈は滑を認める。」

1. 風寒の邪を取り除く。
2. 瘀血を取り除く。
3. 肺陰を補う。
4. 運化を高める。

はき 29-144 次の文で示す患者の病証に対する治療方針として最も適切なのはどれか。

「36 歳の男性。主訴は焦燥感。仕事の重圧によりイライラする。最近は動悸があり、寝付きが悪い。顔が赤く、便秘である。舌尖は紅、脈は数有力を認める。」

1. 肝陰を補う。
2. 心火を瀉す。
3. 脾陽を補う。
4. 肺の痰湿を除く。

はき 29-145 次の文で示す患者の病証に対する治療方針として最も適切なのはどれか。

「43 歳の男性。主訴は咳嗽。仕事が忙しくなると発作的にせき込む。痰が切れにくく、咽頭部に違和感があり、胸脇部が張る。舌は紅、脈は弦数を認める。」

1. 腎陰を補う。
2. 肺気を補う。
3. 肝火を抑える。
4. 痰濁を除く。

はき 29-146 五臓の特徴的な症状と治療穴の組合せで正しいのはどれか。

1. 五更泄瀉 ————— 太 衝
2. 梅核気 ————— 太 淵
3. 陽 萎 ————— 大 陵
4. 多 夢 ————— 神 門

はき 29-147 次の文で示す患者の病証で最も適切なのはどれか。

「51 歳の男性。2 日前に強い寒冷環境で長時間の作業をした後、肩に固定性の痛みとこわばりが生じた。舌は淡、脈は緊を認める。」

1. 行 痹
2. 痛 痹
3. 着 痹
4. 熱 痹

はき 29-148 次の文で示す病証に対する配穴の組合せで最も適切なのはどれか。

「50歳の女性。3週間前に旅行で歩き過ぎて右殿部から大腿外側部のつっぱり感と痛みを自覚した。足先のしびれ、こむら返り、目の疲れも気になる。舌は淡白、脈は細を認める。」

1. 肝 兪 ————— 足臨泣
2. 腎 兪 ————— 束 骨
3. 脾 兪 ————— 陷 谷
4. 膀胱兪 ————— 然 谷

はき 29-149 次の文で示す患者の経脈病証を原絡配穴法で治療する場合、主証で選穴するのはどれか。

「28歳の男性。2か月前から上歯痛や鼻出血、腹鳴がみられるようになり、昨日から舌根部や心窩部が痛み、食事をすると嘔吐するようになった。」

1. 公 孫
2. 太 白
3. 衝 陽
4. 豊 隆

はき 29-150 次の文で示す患者の病証に対して十二刺の刺法に基づき治療する場合、刺鍼部位の指標となるのはどれか。「足先の強い冷えを感じ、ときには腰まで冷えが上ってくる。下痢をしやすい。」

1. 大腿動脈拍動部
2. 膝窩動脈拍動部
3. 後脛骨動脈拍動部
4. 足背動脈拍動部

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 28) 東洋医学臨床論	115～140
-----------------	---------

はき 28-115 「治未病」について誤っているのはどれか。

1. 病気になる前の予防に重点を置く。
2. 治療すべきタイミングに配慮する。
3. 病の兆しを見つけたら早期に治療を開始することに重点を置く。
4. 五臓の病があれば、その母にあたる臓の治療に重点を置く。

はき 28-116 着痹に対して補瀉を考えた刺鍼する場合の適切な手法はどれか。

1. 抜鍼後に鍼孔を閉じる。
2. 浅く入れ、後に深くする。
3. 吸気時に刺入し、呼気時に抜く。
4. 経絡の流注方向に沿って刺入する。

はき 28-117 頑固な腰痛に対する治療で、腰部に鍼を 2 本使用して行うのはどれか。

1. 偶 刺
2. 斉 刺
3. 揚 刺
4. 傍鍼刺

はき 28-118 次の文で示す症例の治療方針として調整すべき経絡で最も適切なのはどれか。

「33 歳の女性。主訴は全身の痛み。3 年前から全身の疼痛に悩まされ、最近になって線維筋痛症と診断された。食欲がなく、雨天時には特に調子が悪く、起き上がることもできない。」

1. 陰維脈
2. 陰蹻脈
3. 脾の大絡
4. 胃の大絡

はき 28-119 次の文で示す患者の病証に対する治療で最も適切な経脈はどれか。

「38 歳の女性。もともと喘息の持病があったが、最近、反抗期の息子に怒ってばかりでイライラし、症状が頻発し、咳も出るようになった。口が苦く咳をすると胸脇部が痛む。舌質紅、舌は薄黄苔、脈は弦数。」

1. 手の太陰経と足の厥陰経
2. 手の太陰経と足の太陰経
3. 手の少陰経と足の厥陰経
4. 手の少陰経と足の太陰経

はき 28-120 次の文で示す患者の病証として最も適切なのはどれか。

「42歳の女性。主訴は頻尿と排尿時痛。尿は途切れがちで黄色く混濁している。会陰部の違和感や残尿感もみられる。舌質紅、脈は滑数。」

1. 脾腎両虚
2. 肝腎陰虚
3. 膀胱湿熱
4. 大腸湿熱

はき 28-121 次の文で示す症例に対して灸治療を行う場合に最も適切な経穴はどれか。

「60歳の女性。主訴は陰部掻痒感。4日前に深酒をした。昨日より右膝内側から大腿部内側のひきつれ感がある。脈は左関上の浮数滑。」

1. 脛骨内縁の後際、内果尖の上方3寸
2. 前脛骨筋の外縁、外果尖の上方8寸
3. 腓骨の前方、外果尖の上方5寸
4. 脛骨内側面の中央、内果尖の上方5寸

はき 28-122 次の文で示す症例の治療穴として太衝とともに用いる原穴はどれか。

「49歳の女性。半年ほど前から、めまい、顔のほてりが起こりやすく、汗が出やすい。腰や膝がだるく、力が入らない。閉経している。舌質紅、脈細数。」

1. 太白
2. 太溪
3. 大陵
4. 太淵

はき 28-123 次の文で示す症例で経脈を考慮した治療穴として最も適切なのはどれか。

「19歳の男性。2か月前に左足関節の内がえし捻挫を起こし、今も痛みが取れない。イライラしやすく、左肩上部のつっぱり感がある。」

1. 第1・第2足指間、みずかきの近位、赤白肉際
2. 第2・第3足指間、みずかきの後縁、赤白肉際
3. 第5中足指節関節外側の遠位陥凹部、赤白肉際
4. 第4・第5足指間、みずかきの近位、赤白肉際

はき 28-124 腰部脊柱管狭窄症に対する診療においてSOAP形式で記録する場合、Aに該当するのはどれか。

1. 間欠跛行距離 300m
2. 腰下肢への低周波鍼通電療法
3. ケンプ徴候陽性
4. 神経根型

はき 28-125 筋肉痛に対する局所施術として、罹患筋と治療穴の組合せで正しいのはどれか。

1. 三角筋 ————— 消 滌
2. 上腕三頭筋 ———— 臂 臑
3. 薄 筋 ————— 膝 関
4. 後脛骨筋 ————— 築 賓

はき 28-126 次の文で示す患者の患側の徒手検査所見で、みられる可能性が最も高いのはどれか。

「60歳の男性。2か月前から右頸肩 upper arm に痛みがある。近医にて頸椎症によるC₆神経根障害と言われた。」

1. モーレイテスト陽性
2. 腕橈骨筋反射減弱
3. ホフマン反射陽性
4. 中指の触覚鈍麻

はき 28-127 次の文で示す症状に対して罹患神経近傍へ施術する場合、最も適切な経穴はどれか。

「手の骨間筋の萎縮がみられ、フローマン徴候陽性である。」

1. 尺 沢
2. 手五里
3. 小 海
4. 内 関

はき 28-128 罹患筋支配の神経近傍への刺鍼を行う場合、症状と治療穴の組み合わせで最も適切なのはどれか。

1. 閉眼困難 ————— 完 骨
2. 足関節外がえし困難 ————— 陽陵泉
3. 手関節背屈困難 ————— 曲 沢
4. 近位指節間関節屈曲困難 ——— 手五里

はき 28-129 罹患筋への治療穴として天泉を用いる疾患で、陽性となる可能性が最も高い理学検査はどれか。

1. スピードテスト
2. ペインフルアークサイン
3. フローマン徴候
4. ティアドロップ徴候

はき 28-130 次の文で示す症例について、陽性となる可能性が最も高い理学検査はどれか。

「45歳の男性。2か月前から左腰下肢に痛みを感じる。前かがみで痛みが増強する。左足底部の知覚鈍麻、アキレス腱反射は 減弱。間欠跛行はみられない。」

1. FNS テスト
2. ボンネットテスト
3. ゲンスレンテスト
4. アリス徴候

はき 28-131 咬筋の過緊張による顎関節症に対する局所治療穴として最も適切なのはどれか。

1. 頬 車
2. 上 関
3. 地 倉
4. 顴 髎

はき 28-132 高齢者に対する評価法とその目的との組合せで正しいのはどれか。

1. バーセルインデックス ————— 認知症の評価
2. 改訂 PGC モラールスケール ——— 歩行機能の評価
3. MMSE ————— ADL の評価
4. ハミルトン評価尺度 ————— 抑うつ状態の評価

はき 28-133 徒手検査法の陽性所見と罹患筋への治療穴との組合せで適切なのはどれか。

1. トンプソンテスト ————— 豊 隆
2. トムゼンテスト ————— 支 正
3. 足関節内反ストレステスト ——— 照 海
4. グラスピングテスト ————— 膝陽関

はき 28-134 次の文で示す患者の罹患筋に対する治療穴として最も適切なのはどれか。

「20 歳の男性。ラグビーで反復性の肩関節脱臼を起こしている。先日、脱臼して整復されたが、肩の外側にしびれと筋の脱力感による挙上制限がみられた。」

1. 巨 骨
2. 秉 風
3. 臂 臑
4. 天 宗

はき 28-135 「71 歳の男性。100m の歩行で左下腿後面に絞扼痛が出現、休息で軽快。仰臥位で両下肢を挙上させ 30 秒足趾を屈伸させると患側足底部が白くなる。SLR テスト陰性。」

身体診察で患側下肢にみられる所見はどれか。

1. ケンプ徴候陽性
2. 足底部の触覚鈍麻
3. アキレス腱反射減弱
4. 足背動脈拍動減弱

はき 28-136 「71 歳の男性。100m の歩行で左下腿後面に絞扼痛が出現、休息で軽快。仰臥位で両下肢を挙上させ 30 秒足趾を屈伸させると患側足底部が白くなる。SLR テスト陰性。」本症例で、症状のある筋の支配神経近傍に刺鍼し、低周波鍼通電療法を行う場合、最も適切な経穴はどれか。

1. 陰 廉
2. 委 中
3. 足三里
4. 陽陵泉

はき 28-137 「26 歳の男性。主訴は腹痛と下痢。I T 企業でストレスの多い仕事に従事している。1 日数回排便する。器質的な病変はない。」下痢の病態で最も適切なのはどれか。

1. 消化管からの分泌亢進
2. 消化管運動の亢進
3. 消化管知覚閾値の上昇
4. 消化管支配の交感神経機能亢進

はき 28-138 「26 歳の男性。主訴は腹痛と下痢。I T 企業でストレスの多い仕事に従事している。1 日数回排便する。器質的な病変はない。」本症例の病証として最も適切なのはどれか。

1. 脾気虚
2. 脾腎陽虚
3. 肝脾不和
4. 腎気虚

はき 28-139 「18 歳の男性。主訴は頭痛。7 日前に薄着で体が冷え、その日の夜から悪寒、発熱頭痛を自覚し、風邪薬を飲んでも完治しない。咳と痰はなく、汗をかきやすい。舌は薄白苔、脈は浮緩。」病証として最も適切なのはどれか。

1. 肺陰虚証
2. 手の太陰経脈病証
3. 手の少陰経脈病証
4. 風寒表虚証

はき 28-140 「18 歳の男性。主訴は頭痛。7 日前に薄着で体が冷え、その日の夜から悪寒、発熱頭痛を自覚し、風邪薬を飲んでも完治しない。咳と痰はなく、汗をかきやすい。舌は薄白苔、脈は浮緩。」

本症例に対する治療として適切なのはどれか。

1. 背部兪穴を瀉して去風する。
2. 肺経の要穴を使って陰液を補う。
3. 膀胱経の要穴を使って経脈を疏通する。
4. 肺経の要穴を補って表を閉じる。

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 27) 東洋医学臨床論	115～140
-----------------	---------

はき 27-115 脈証と治療方針の組合せで最も適切なのはどれか。

1. ざらざらとして流れの悪い脈 ————— 気を巡らせ活血する。
2. 輪郭は触れるが中が空虚な脈 ————— 肝の疏泄を調節する。
3. 玉が転がるような脈 ————— 心熱を清瀉する。
4. 絹糸に触れるような力のある脈 ————— 気血を補益する。

はき 27-116 東洋医学的な治療方針として、身体を温めるべき症状はどれか。

1. 盗汗
2. 口苦
3. 消穀善飢
4. 白色帯下

はき 27-117 次の文で示す患者の病証で最も適切なのはどれか。

「80歳の男性。日頃から腰下肢にだるさがあり、顔や目が赤く、頭や肩に張ったような痛みもあった。昨日、トイレで倒れ、舌が強ばって話しづらくなり、左の上下肢が麻痺した。」

1. 肝腎陰虚
2. 肝風内動
3. 肝陽上亢
4. 肝気鬱結

はき 27-118 次の文で示す患者の病証に対する治療方針で最も適切なのはどれか。

「27歳の女性。長時間の VDT 作業で目に疲れと乾きを感じる。視力も低下し、疲れがたまると時々手がふるえる。舌質は淡、舌苔は薄、脈は細。」

1. 肝血を補う。
2. 脾陽を補う。
3. 腎陰を補う。
4. 肺気を補う。

はき 27-119 次の文で示す患者の病証に対する治療で最も適切なのはどれか。

「38歳の男性。主訴は鼻閉と鼻汁。鼻汁は黄色く粘りがあり量も多い。日中は頭がぼんやりすることが多く、皮膚掻痒感や嗅覚障害もある。舌質は紅、胖大舌。」

1. 太淵に補法を行う。
2. 太白に補法を行う。
3. 豊隆に瀉法を行う。
4. 風門に瀉法を行う。

はき 27-120 次の文で示す患者の病証に対する治療穴として、経脈の異常に基づく選穴で最も適切なのはどれか。「60 歳の男性。主訴は右上の歯茎の痛み。長期間ストレスが続き、3 日前から胸焼けとともに歯茎が腫れて軽く噛み合わせても痛む。脈は右関上が浮滑。」

1. 上 関
2. 内 庭
3. 顴 髎
4. 合 谷

はき 27-121 次の文で示す患者の病証に対する治療方針として最も適切なのはどれか。

「46 歳の男性。主訴は 肩こり。仕事で神経を使うことが多く肩こりが気になり始めた。イライラしやすく、こりがひどくなると肩上部のつまった感じがする。脈は左関上が弦。」

1. 気を散らす。
2. 脾気を補う。
3. 運化を促す。
4. 瘀血を除く。

はき 27-122 次の文で示す患者の病態に対し、罹患局所への施術対象となる経穴で最も適切なのはどれか。

「28 歳の女性。テニスを 10 年続けて上級者となってきた。2 週間ほど前から肘の内側に痛みを感じるようになった。熱感や腫脹はない。」

1. 肺経の絡穴
2. 心包経の郄穴
3. 大腸経の絡穴
4. 三焦経の郄穴

はき 27-123 次の文で示す患者の病証に対し、募穴を用いて施術をする際、最も適切な組合せはどれか。

「27 歳の女性。精神的ストレスにより便秘と下痢を繰り返している。腹痛は排便により軽減する。痩せ型で腹鳴もみられることがある。」

1. 期 門 ——— 章 門
2. 日 月 ——— 期 門
3. 中 脘 ——— 章 門
4. 京 門 ——— 章 門

はき 27-124 次の文で示す病証に対して治療すべき足の経脈・経筋として最も適切なのはどれか。

「26 歳の男性。主訴は膝の痛み。4 日前に宴会で食べ過ぎた。その後、背中の張り感やだるさとともに、趣味のバスケットボールでジャンプしたときに膝に痛みを自覚する。舌中央部に黄厚膩苔がある。」

1. 太陰経
2. 厥陰経
3. 陽明経
4. 少陽経

はき 27-125 上腕骨外側上顆炎の患者に対する SOAP 方式による記録で、P に相当するのはどれか。

1. タオルがしぼりにくい
2. トムゼンテスト陽性
3. 動作後のアイシング
4. 短橈側手根伸筋の過緊張

はき 27-126 レイノー現象を呈する患者の局所へ低周波鍼通電療法を行う場合、最も適切なのはどれか。

1. 八 邪
2. 四 華
3. 闌 尾
4. 四神聡

はき 27-127 高齢者の歩行能力に対する鍼治療の効果を評価するのに最も適切なのはどれか。

1. RDQ
2. 改訂PGCモラールスケール
3. ハミルトン評価尺度
4. タイムドアップアンドゴーテスト

はき 27-128 眼の疲労に対して下頭斜筋へ刺鍼する場合、最も適切なのはどれか。

1. 玉 枕
2. 風 池
3. 大 杼
4. 頭 維

はき 27-129 次の文で示す症例について、身体診察でみられる可能性が最も高いのはどれか。

「54 歳の男性。半年前から右肩関節の疼痛が出現した。最近では疼痛は幾分軽減したが運動制限が顕著となった。ADLでは衣服の着脱が不自由であり、結帯動作の制限がある。」医療機関で肩関節周囲炎と診断されている。

1. ドロップアームサイン陽性
2. ルーステスト陽性
3. 肩甲上腕リズム正常
4. エンドフィール明瞭

はき 27-130 局所治療穴として曲池が最も適切なのはどれか。

1. ティネル徴候陽性
2. ファレンテスト陽性
3. チェアテスト陽性
4. フローマン徴候陽性

はき 27-131 切迫性尿失禁に対して体性-内臓反射に基づいた治療穴として最も適切なのはどれか。

1. 三焦俞
2. 志 室
3. 中 髎
4. 中 注

はき 27-132 次の文で示す症例に対して神経を介した治療部位として最も適切なのはどれか。

「52 歳の女性。1 年前に子宮癌で摘出手術を受けた。転移はない。会陰部の痛みとともに、尿失禁も起こるようになった。」

1. 上後腸骨棘と大転子頂点の midpoint の下方 4cm の点
2. 上後腸骨棘と坐骨結節下端内側を結ぶ線の上から 50～60% の点
3. 仙骨角と大転子頂点の midpoint
4. 尾骨先端と大転子頂点の midpoint

はき 27-133 次の文で示す症例の圧痛点に対する局所治療穴として最も適切なのはどれか。

「20 歳の女性。高校時代にバレーボール部の活動で前距腓靭帯損傷を繰り返し起こしていた。罹患靭帯のやや下方に圧痛と歩行時痛があり、近医で足根洞症候群と診断された。」

1. 解 溪
2. 照 海
3. 申 脈
4. 丘 墟

はき 27-134 より高次な生活能力を評価する指標(老研式活動能力指標)に含まれる項目はどれか。

1. 髪を整える
2. 衣服の着脱
3. 階段の昇降
4. 銀行預金の出し入れ

はき 27-135 「18 歳の男性。昨日雨に濡れ、その夜から悪寒、発熱、後頭部痛が出現した。脈は浮緊、舌は淡紅で薄白苔。咳、痰、鼻水はない。」本症例の病証で最も適切なのはどれか。

1. 肺気虚証
2. 手太陰経脈病証
3. 足太陽経脈病証
4. 風寒表実証

はき 27-136 「18 歳の男性。昨日雨に濡れ、その夜から悪寒、発熱、後頭部痛が出現した。脈は浮緊、舌は淡紅で薄白苔。咳、痰、鼻水はない。」本症例に対する治療方針として適切なのはどれか。

1. 宣散作用を調節する。
2. 経脈を疏通する。
3. 温めて補う。
4. 表を開き発散させる。

はき 27-137 「63 歳の女性。主訴は尿もれ。咳をしたり、重い荷物を持ったりすると尿がもれる。腰背部がだるく、足が冷える。舌は淡で歯痕、脈は沈細。」本症例の尿もれと最も関係するのはどれか。

1. 骨盤底筋群
2. 大殿筋
3. 膀胱排尿筋
4. 腹直筋

はき 27-138 「63 歳の女性。主訴は尿もれ。咳をしたり、重い荷物を持ったりすると尿がもれる。腰背部がだるく、足が冷える。舌は淡で歯痕、脈は沈細。」本症例の病証に対し、難経六十九難による鍼治療で使用するのはいずれか。

1. 大 都
2. 太 白
3. 経 渠
4. 曲 泉

はき 27-139 「78 歳の女性。主訴は疲労感。最近、疲れやすく、動くのが面倒になった。意欲が低下し、食欲も減退している。病院ではサルコペニアと言われた。」本症例の診断に用いないのはいずれか。

1. 握 力
2. 歩行速度
3. 骨格筋量
4. 酸素飽和度

はき 27-140 「78 歳の女性。主訴は疲労感。最近、疲れやすく、動くのが面倒になった。意欲が低下し、食欲も減退している。病院ではサルコペニアと言われた。」本症例の病証で最もみられる脈状はいずれか。

1. 滑 脈
2. 結 脈
3. 緩 脈
4. 弦 脈

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 26) 東洋医学臨床論	115～140
-----------------	---------

はき 26-115 次の文で示す患者の病証に対して経脈の疏通を目的として治療する場合、最も適切な治療穴はどれか。「56歳の男性。主訴は右肩関節痛。右手で引き戸を右に開こうとする動作時に激痛が起こる。整形外科では、四辺形間隙症候群と診断された。」

1. 後 溪
2. 液 門
3. 二 間
4. 魚 際

はき 26-116 次の文で示す患者の病証に対する治療穴で最も適切なのはどれか。

「65歳の男性。1週間前に食べ過ぎて胃のもたれ感の後、右上の奥の歯茎が腫れて痛むようになってきた。腹診では上腹部に緊張と熱感がみられ、右関上の脈は滑数。舌質はやや紅、中央に黄厚膩苔。」

1. 腎経の栄火穴
2. 胃経の栄水穴
3. 大腸経の栄水穴
4. 脾経の栄火穴

はき 26-117 次の文で示す患者の病証に対する治療方針で最も適切なのはどれか。

「40歳の男性。主訴は肩こり。人間関係のトラブルから徐々に自覚。頸肩部の動作時痛や牽引感はないが、肩の張りが持続する。ひどくなると咽に何かがつかえた感じがする。」

1. 肝気を疏通し気滞を除く。
2. 腎気を補益する。
3. 陽明経を疏通する。
4. 肝腎経を補う。

はき 26-118 経脈病証で先に手の陽明経が病み、次に手の太陰経が病んだ場合、原絡配穴法の原則に従った選穴で正しい組合せはどれか。

1. 太 淵 ——— 偏 歴
2. 偏 歴 ——— 合 谷
3. 合 谷 ——— 列 欠
4. 列 欠 ——— 太 淵

はき 26-119 次の文で示す患者の病証に対する治療方針で最も適切なのはどれか。

「24 歳の男性。主訴は頸から上の痒み。以前からアトピー性皮膚炎による痒みがあったが、症状の変化が激しくなってきた。悪化すると滲出性になる。普段から甘いものを好み、過食すると悪化する。舌苔は白膩、脈は滑」

1. 風寒の邪を除く。
2. 運化作用を高め、湿を化す。
3. 血を養い、燥を潤す。
4. 血熱を除く。

はき 26-120 季節に応ずる脈状で、8 月下旬に鍼灸治療を行う場合、難経十五難に基づいて健康と判断するのはどれか。

1. やや弦
2. やや鈎
3. やや石
4. やや毛

はき 26-121 次の文で示す患者の病証に対する治療方針で最も適切なのはどれか。

「35 歳の女性。主訴は月経痛。1 年前に第 4 子を出産してから月経後に疲労・倦怠感が強くなり、足腰がだるく、耳鳴りもある。経血は色が淡く、量は少なく稀薄。舌質は淡、脈は沈細。」

1. 肝気を疏通し、瘀血を去る。
2. 下焦を温め、痛みを緩和する。
3. 肝腎経を補益する。
4. 陰液を養い、熱を去る。

はき 26-122 次の文で示す症例に対して障害部位を走行する経脈の同名経の治療穴で最も適切なのはどれか。

「52 歳の男性。主訴は膝外側の痛み。最近、趣味である朝のジョギング時に膝外側の痛みを自覚したことから来院。徒手検査でグラスピングサインが陽性であった。」

1. 下 廉
2. 大 陵
3. 会 宗
4. 少 府

はき 26-123 次の文で示す症例に対して障害神経を考慮して循経取穴を行う場合、最も適切な治療穴はどれか。「46 歳の女性。最近、指尖で物をつまむピンチ動作ができなくなったため来院。ティアドロップ徴候は陽性。知覚障害は認められなかった。」

1. 肘 髎
2. 小 海
3. 消 瀾
4. 曲 沢

はき 26-124 十二刺のうち、筋の異常緊張に対して関節近傍の腱に刺鍼するのはどれか。

1. 賛 刺
2. 短 刺
3. 陰 刺
4. 恢 刺

はき 26-125 医療面接で開放的質問に相当するのはどれか。

1. 今日はどうされましたか。
2. いつから痛みますか。
3. アレルギーをおもちですか。
4. 過去に大きな病気にかかったことがありますか。

はき 26-126 徒手検査所見と罹患部への局所治療穴の組合せで最も適切なのはどれか。

1. フローマン徴候陽性 ————— 神 門
2. アイヒホツフテスト陽性 ——— 陽 池
3. トムゼンテスト陽性 ————— 陽 溪
4. ファレンテスト陽性 ————— 経 渠

はき 26-127 次の文で示す症例に対する鍼灸の効果を評価するのに最も適切なのはどれか。

「62 歳の女性。主訴は肩こり。半年ほど前から興味や喜びがわかなくなり、食欲が減退し、よく眠れず朝早く目が覚める。疲れやすく思考力が低下している。幻覚や記憶の障害はなく、動悸、めまいもない。」

1. 改訂長谷川式簡易知能評価スケール
2. ハミルトン評価尺度
3. タイムドアップアンドゴーテスト
4. ロコモ度テスト

はき 26-128 次の文で示す患者の病態に対し、罹患局所への施術対象となる神経根で最も適切なのはどれか。

「40 歳の男性。腰椎椎間板ヘルニアを発症し、腰下肢痛がある。患側の母指底屈筋力の低下、アキレス腱反射減弱、足底の知覚鈍麻がみられた。」

1. L3 神経根
2. L4 神経根
3. L5 神経根
4. S1 神経根

はき 26-129 頸部の神経根障害により手関節背屈と肘関節屈曲の筋力低下がみられる患者に対し、デルマトームを考慮して治療する場合、最も適切な治療穴はどれか。

1. 曲 池
2. 曲 沢
3. 小 海
4. 少 海

はき 26-130 肩甲骨の下方回旋筋拘縮による肩の外転障害がみられる場合、局所施術部位として最も適切なものはどれか。

1. 肩 井
2. 肩外兪
3. 膏 盲
4. 扶 突

はき 26-131 末梢神経麻痺と罹患筋への低周波鍼通電療法で用いる経穴との組合せで最も適切なものはどれか。

1. 橈骨神経麻痺 ———— 手五里・温 溜
2. 正中神経麻痺 ———— 尺 沢・通 里
3. 深腓骨神経麻痺 ———— 陽 輔・懸 鍾
4. 脛骨神経麻痺 ———— 条 口・解 溪

はき 26-132 次の文で示す症例に対し、局所治療穴を定めるための徒手検査で陽性になる可能性が最も高いものはどれか。

「21 歳の男性。大学で水泳部に所属し、専門はフリースタイル。肩の外転、屈曲時に肩前外側に痛みを呈する。」

1. イートンテスト
2. エデンテスト
3. インピンジメントテスト
4. リフトオフテスト

はき 26-133 次の文で示す神経麻痺の罹患神経に対して低周波鍼通電療法を行う場合、経穴の組合せとして最も適切なものはどれか。

「手背の骨間溝が著明で鈎爪指がみられるが、パーフェクト0は正常であった。」

1. 偏 歴 ———— 曲 池
2. 太 淵 ———— 孔 最
3. 内 関 ———— 郄 門
4. 支 正 ———— 小 海

はき 26-134 次の文で示す症例に対する治療穴で最も適切なものはどれか。

「35 歳の女性。職業は事務員。右前腕前面近位部の疼痛と第 1 指から第 4 指橈側半の掌側および母指球にしびれがある。前腕の回内動作に抵抗を加えると症状が増悪する。ファレンテスト陰性。」

1. 手三里
2. 孔 最
3. 大 陵
4. 四 瀆

はき 26-135 「37 歳の男性。主訴は不眠。仕事の期限に間に合わせるため長時間労働が続き、疲労感とともに肩こり、腹部膨満感、中途覚醒に悩まされている。よくため息をつく。舌診では舌辺が赤く、腹診では胸脇苦満が認められた。」本症例が示す病証でみられやすい脈状はどれか。

1. 浮脈
2. 弦脈
3. 濇脈
4. 滑脈

はき 26-136 「37 歳の男性。主訴は不眠。仕事の期限に間に合わせるため長時間労働が続き、疲労感とともに肩こり、腹部膨満感、中途覚醒に悩まされている。よくため息をつく。舌診では舌辺が赤く、腹診では胸脇苦満が認められた。」本症例の病証で最も適切なのはどれか。

1. 肝気鬱結
2. 心気虚
3. 脾気虚
4. 腎陰虚

はき 26-137 「69 歳の男性。主訴は頻尿。一晩に 2、3 回トイレに行く。泌尿器科で過活動膀胱と診断された。舌診では舌根部の舌苔が厚く、腹診では下腹部の軟弱がみられた。脈診では左尺中の沈が虚であった。」本疾患の排尿に関する症状で最も適切なのはどれか。

1. 残尿感
2. 遷延性排尿
3. 尿意切迫
4. 再延性排尿

はき 26-138 「69 歳の男性。主訴は頻尿。一晩に 2、3 回トイレに行く。泌尿器科で過活動膀胱と診断された。舌診では舌根部の舌苔が厚く、腹診では下腹部の軟弱がみられた。脈診では左尺中の沈が虚であった。」本症例に対して難経六十九難に基づき、一つは肺経の経金穴を配穴した。もう一つの治療穴の部位はどれか。

1. 足内側、内果後下方、踵骨上方、アキレス腱付着部内側前方の陥凹部
2. 足内側、内果尖の下方 1 寸、内果下方の陥凹部
3. 下腿後内側、アキレス腱の前縁、内果尖の上方 2 寸
4. 下腿内側、脛骨内縁の後方の陥凹部、内果尖の上方 2 寸

はき 26-139 「36 歳の女性。締め付けの強い下着をはくようにしたところ、最近、太ももの外側部に痛みとしびれが起こったので来院した。運動麻痺はない。MRI では腰椎の異常はなかった。」本症例の障害神経はどれか。

1. 第 1・第 2 腰神経から起こり、大腰筋を貫く神経
2. 第 2・第 3 腰神経から起こり、大腰筋と腸骨筋の間を斜め外側下方に走る神経
3. 第 4・第 5 腰神経および第 1・第 2・第 3 仙骨神経から起こり、梨状筋下孔を通過する神経
4. 第 2・第 3・第 4 腰神経から起こり、筋裂孔を通過する神経

はき 26-140 「36 歳の女性。締め付けの強い下着をはくようにしたところ、最近、太ももの外側部に痛みとしびれが起こったので来院した。運動麻痺はない。MRI では腰椎の異常はなかった。」

本症例に対する刺鍼部位として最も適切なのはどれか。

1. 上後腸骨棘と大転子を結んだ中点より垂直に約 3cm 下がった部位
2. 第 4 腰椎と第 5 腰椎棘突起間の外側約 2cm の部位
3. 上前腸骨棘より約 2.5cm 内方でそこから下に約 2.5cm の部位
4. 鼠径靱帯の直下で大腿動脈拍動部の外方約 1cm の部位

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 25) 東洋医学臨床論	115～140
-----------------	---------

はき 25-115 睡眠障害をきたす病証と随伴症状の組合せで最も適切なのはどれか。

1. 心 火 ————— 食欲不振
2. 肝 火 ————— 腰 痛
3. 痰 熱 ————— 胃脘部のつかえ
4. 心脾両虚 ——— 口 苦

はき 25-116 次の文で示す患者の病証で最も適切なのはどれか。

「43 歳の女性。主訴は下痢。最近、近隣の住人とのトラブルがあり、咽のつかえを自覚し、よくため息をつくようになった。その後下痢を発症。腹痛の後に生じることが多い。」

1. 肝気犯脾証
2. 心脾両虚証
3. 脾胃湿熱証
4. 脾腎陽虚証

はき 25-117 次の文で示す患者の病証で最も適切なのはどれか。

「82 歳の女性。主訴は腰痛。頻尿があり、くしゃみなどで失禁することがある。」

1. 腎陽虚
2. 腎精不足
3. 腎不納気
4. 腎気不固

はき 25-118 次の文で示す患者の病証に対する治療方針で適切なのはどれか。

「32 歳の男性。項から背中にかけてこわばりを自覚した。強い悪寒と軽い熱っぽさも伴う。鼻がつまり咳が出てきたため来院。脈は浮緊。」

1. 解 表
2. 潤 肺
3. 利 湿
4. 和 胃

はき 25-119 次の文で示す患者の病証に対し、八会穴を用いて治療を行う場合最も、適切なのはどれか。

「35 歳の女性。1 か月前に出産し、現在授乳中だが、乳房に張った感じがなく、乳汁の分泌が少ない。出産時に出血が多かったせいか顔色は青白く、爪や唇の色は白っぽい。舌質は淡、脈は虚細。」

1. 膈 兪
2. 大 杼
3. 陽陵泉
4. 太 淵

はき 25-120 次の文で示す患者の病証に対して原絡配穴法により治療を行う場合、経穴部位として最も適切なのはどれか。「48歳の男性。主訴は腰痛。痛みで上体を反らすことができない。咽の渇き、陰囊の疼痛を伴うこともある。」

1. 下腿前内側、脛骨内側面の中央、内果尖の上方5寸
2. 下腿外側、腓骨の前方、外果尖の上方5寸
3. 足関節後内側、内果尖とアキレス腱の間の陥凹部
4. 足外側、第5中足骨粗面の遠位、赤白肉際

はき 25-121 鍼灸治療についてSOAP形式で記録する場合、Aに該当するのはどれか。

1. 医療面接の内容
2. 他覚的所見
3. 治療内容
4. 治療経過の評価

はき 25-122 C8神経根障害でデルマトームを応用した低周波鍼通電療法を行う場合の経穴の組合せで最も適切なのはどれか。

1. 合谷 —— 温溜
2. 神門 —— 後溪
3. 列欠 —— 孔最
4. 手五里 —— 臂臑

はき 25-123 肩関節外転90度で外旋の自動運動を行ったところ、肩の後方の疼痛を自覚した。罹患筋への刺鍼部位として最も適切なのはどれか。

1. 結節間溝
2. 肩甲骨下角
3. 棘下窩の中央
4. 隆椎と肩峰の midpoint

はき 25-124 肩甲上腕関節の拘縮の所見はどれか。

1. 自動運動より他動運動の可動域が大きい。
2. 肩甲上腕リズムが1:2である。
3. 肩峰直下に圧痛がある。
4. エンドフィールが明瞭である。

はき 25-125 脳卒中後の後遺症による上肢の屈曲拘縮に対し拮抗抑制を利用する目的で低周波鍼通電療法を行う場合の経穴の組合せで最も適切なのはどれか。

1. 肩髃 —— 肩髃
2. 天泉 —— 侠白
3. 消灤 —— 臑会
4. 少海 —— 間使

はき 25-126 次の文で示す患者への施術で罹患神経への治療穴として最も適切なのはどれか。「30 歳の女性。1 週間前から手の小指側にしびれを感じ、母指の内転運動障害がみられる。フローマン徴候陽性、ファレンテスト陰性。」

1. 列 欠
2. 霊 道
3. 大 陵
4. 陽 池

はき 25-127 徒手検査所見と罹患部への治療穴の組合せで適切なのはどれか。

1. チェアテスト陽性 ————— 支 正
2. グラスピングテスト陽性 ————— 膝陽関
3. K. ボンネットテスト陽性 ———— 関元兪
4. インピンジメントテスト陽性 —— 臑 会

はき 25-128 次の文で示す症例で罹患筋を対象に施術する場合、最も適切なのはどれか。「32 歳の男性。野球チームでピッチャーをしている。最近、投球動作でフォロースルー期に肩後方の痛みを感じるようになった。」

1. 前鋸筋
2. 小胸筋
3. 肩甲下筋
4. 小円筋

はき 25-129 次の文で示す高齢者の機能評価はどれか。「椅子から立ち上がり、3m先の目印を回って、再び椅子に座るまでの歩行時間を測定する。」

1. P C Gモラールスケール
2. ロコモ度テスト
3. タイムドアップアンドゴーテスト
4. バーセルインデックス

はき 25-130 次の文で示す症例に対する治療でデルマトームを応用した経穴として最も適切なのはどれか。「22 歳の女性。主訴は便秘。便意の抑制の習慣化により発症した。近医を受診し、器質的病変は認められなかった。」

1. 膈 兪
2. 胃 兪
3. 大腸兪
4. 中 膠

はき 25-131 次の文で示す症例で行った検査法はどれか。「55 歳の男性。最近、耳の聞こえが悪くなり来院した。音叉を鳴らし、その把持部を乳様突起に当て、音が聞こえなくなった後、外耳孔近くで音叉の音を聞かせた。」

1. リンネ検査
2. ロンベルグ検査
3. ビング検査
4. ウェーバー検査

はき 25-132 下顎を挙上し後方移動すると顎関節が痛む場合、主動作筋への局所治療穴として最も適切なのはどれか。

1. 下 関
2. 曲 髻
3. 顴 髁
4. 頬 車

はき 25-133 「24 歳の男性。1 か月前から右下肢痛を自覚。近医を受診してMR I 検査にて椎間板ヘルニアと診断された。S L Rテスト陽性。アキレス腱反射減弱。」痛みを評価する方法として最も適切なのはどれか。

1. C M I
2. ローランドモリス デイスアビリティ クエスチヨナリー (R D Q)
3. ニューメリカル レイティングスケール (N R S)
4. ロールシャッハテスト

はき 25-134 「24 歳の男性。1 か月前から右下肢痛を自覚。近医を受診してMR I 検査にて椎間板ヘルニアと診断された。S L Rテスト陽性。アキレス腱反射減弱。」障害神経根のデルマトーム領域に治療穴を求める場合、最も適切なのはどれか。

1. 陥 谷
2. 太 溪
3. 殷 門
4. 束 骨

はき 25-135 「68 歳の男性。主訴は呼吸困難。体を動かすと呼吸が苦しくなる。樽状胸を呈し、痩せている。呼吸機能検査で 1 秒率の低下および胸部エックス線写真で肺野の透過性亢進を認めた。ブリンクマン指数は 960。」本症例の疾患で最も考えられるのはどれか。

1. 気管支拡張症
2. 肺 癌
3. C O P D
4. 間質性肺炎

はき 25-136 「68 歳の男性。主訴は呼吸困難。体を動かすと呼吸が苦しくなる。樽状胸を呈し、痩せている。呼吸機能検査で 1 秒率の低下および胸部エックス線写真で肺野の透過性亢進を認めた。ブリンクマン指数は 960。」本症例の呼吸機能を改善することを目的とした鍼治療で、最も適切な対象となる筋はどれか。

1. 大胸筋
2. 棘上筋
3. 菱形筋
4. 前鋸筋

はき 25-137 「23 歳の女性。体操の選手で運動性無月経がみられる。東洋医学的所見では顔色は白く、肌につやがない。舌は淡白。脈は細。」本症例の無月経の原因で適切なのはどれか。

1. 貧 血
2. 利用できるエネルギー不足
3. プロゲステロン不足
4. 高プロラクチン血症

はき 25-138 「23 歳の女性。体操の選手で運動性無月経がみられる。東洋医学的所見では顔色は白く、肌につやがない。舌は淡白。脈は細。」本症例の病証で最も適切なのはどれか。

1. 陽虚証
2. 表虚証
3. 血虚証
4. 陰虚証

はき 25-139 「58 歳の女性。主訴は右手掌の痛み・しびれ。痛みの部位は小指を除く手掌部である。」本症例に行った徒手検査法で陽性を示すのはどれか。

1. トムゼンテスト
2. ファレンテスト
3. インピンジメントテスト
4. チェアテスト

はき 25-140 「58 歳の女性。主訴は右手掌の痛み・しびれ。痛みの部位は小指を除く手掌部である。」本症例の病態部位への刺鍼で適切なのはどれか。

1. 手関節掌側横紋上で橈側手根屈筋腱の橈側直側部
2. 手関節掌側横紋上で長掌筋腱の尺側直側部
3. 手関節掌側横紋上で尺側手根屈筋腱の尺側直側部
4. 舟状骨結節と豆状骨を結んだ線の中央部

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 24) 東洋医学臨床論	116～140
-----------------	---------

はき 24-116 変形性膝関節症の患者に対する SOAP 方式による経過記録で P に相当するのはどれか。

1. 階段昇降時の膝の痛み
2. 膝関節の屈曲拘縮
3. 内側広筋の萎縮
4. 大腿四頭筋訓練

はき 24-117 四診法で得られた所見で予後が最も悪いのはどれか。

1. 仮 神
2. 少 気
3. 畏 寒
4. 濇 脈

はき 24-118 機能性月経困難症の患者の治療でデルマトームを考慮して選穴する場合、適切でないのはどれか。

1. 関 元
2. 脾 俞
3. 三焦俞
4. 大腸俞

はき 24-119 異常歩行とその原因となる筋に対する局所治療穴との組合せで正しいのはどれか。

1. 鶏 歩 ————— 三陰交
2. はさみ脚歩行 ————— 陽陵泉
3. 分回し歩行 ————— 足三里
4. トレンデレンブルグ歩行 ——— 居 髎

はき 24-120 末梢神経麻痺と罹患筋への低周波鍼通電療法で用いる経穴との組合せで正しいのはどれか。

1. 筋皮神経麻痺 ——— 外 関・陽 池
2. 橈骨神経麻痺 ——— 曲 池・合 谷
3. 正中神経麻痺 ——— 支 正・小 海
4. 尺骨神経麻痺 ——— 郄 門・内 関

はき 24-121 胃痛に対して行う低周波鍼通電療法で、デルマトームを応用した経穴の組合せとして正しいのはどれか。

1. 三焦俞 ————— 腎 俞
2. 膈 俞 ————— 肝 俞
3. 玉 枕 ————— 天 柱
4. 大 杼 ————— 肺 俞

はき 24-122 次の文で示す患者の東洋医学的病態で適切なのはどれか。

「65 歳の男性。主訴は排尿痛。3 年前から自覚するようになった。飲食の不摂生から便がすっきり出ないときに痛みが強くなり、下腹部の不快感を伴う。尿は色が濃くて量が少ない。舌質は紅、舌苔は黄膩。脈は滑数。」

1. 下焦の湿熱
2. 命門の火衰
3. 肅降の失調
4. 運化の低下

次の文で示す症例について、はき 24-123、はき 24-124 の問いに答えよ。

「74 歳の男性。農業に従事。主訴は頻尿と会陰部の不快感。10 年前から尿が出始めるまでに時間がかかるようになった。就寝後、排尿のため 2 回は覚醒する。PSA 値は正常範囲内である。会陰部の不快感が増強している。血尿、尿混濁は認めず、排尿痛はない。」

はき 24-123 本症例の疾患で最も適切なのはどれか。

1. 膀胱炎
2. 膀胱結石
3. 前立腺肥大症
4. 前立腺癌の進行期

はき 24-124 会陰部の症状緩和を目的に陰部神経への鍼施術を行う場合、刺鍼部位の目安となる体表点で最も適切なのはどれか。

1. 上後腸骨棘と坐骨結節下端内側を結ぶ線上の中点
2. 大転子と上後腸骨棘を結ぶ線の中点から直角下方 3cm の点
3. 大転子と坐骨結節を結ぶ線上の内側 3 分の 1 の点
4. 大転子と仙尾関節を結ぶ線上の外側 3 分の 1 の点

はき 24-125 肩関節周囲炎の内旋制限に対し、拘縮している筋への施術で適切な経穴はどれか。

1. 肩 井
2. 曲 垣
3. 天 宗
4. 中 府

次の文で示す症例について、はき 24-126、はき 24-127 の問いに答えよ。

「38 歳の女性。1 か月前から家事動作で右手首の橈側が痛むようになり、近医にてドケルバン病と診断された。湿布を続けたが徐々に痛みが増強したため来院。」

はき 24-126 病態を確認する目的で行うアイヒホッフテストの方法で正しいのはどれか。

1. 母指を中に入れて握った手の尺屈を指示する。
2. 母指を外にして握った手の尺屈を指示する。
3. 母指を中に入れて握った手の橈屈を指示する。
4. 母指を外にして握った手の橈屈を指示する。

はき 24-127 罹患筋に対する鍼施術で適切な経穴はどれか。

1. 孔 最
2. 支 溝
3. 偏 歴
4. 手三里

はき 24-129 次の文で示す患者の仙骨部に施灸する場合、最も適切なのはどれか。

「5歳の男児。夜間の遺尿が続いている。鍼灸治療は初めて。」

1. 焦灼灸
2. 打膿灸
3. 知熱灸
4. 透熱灸

はき 24-130 高齢者の運動器の機能評価に用いるのはどれか。

1. PGCモラールスケール
2. MMSE
3. バーセルインデックス
4. ロコモ度テスト

はき 24-131 承山への刺鍼が最も有効なスポーツ外傷で陽性となる徒手検査はどれか。

1. ラックマンテスト
2. トンプソンテスト
3. コーゼンテスト
4. グラスピングテスト

はき 24-132 次の文で示す患者の病証に対し、循経取穴で瀉法を行う経穴はどれか。

「36歳の男性。1か月前に右足の内がえし捻挫を起こした。現在、腫脹は取れたが、前距腓靭帯部の熱感と動作時の疼痛が残っている。下腿外側部の自発痛を伴う。ストレスが増すと痛みは強くなり口苦を自覚する。舌質は紅、舌辺の舌苔は剥落。脈は滑。」

1. 内庭
2. 俠溪
3. 行間
4. 然谷

はき 24-133 素問、靈樞、難経の「治未病」に関して誤っているのはどれか。

1. 病気になる前に予防する。
2. 病の兆候を早期に発見して早期に治療する。
3. 治療すべきタイミングが重要である。
4. 1つの臓を病めば治未病の概念からはずれる。

はき 24-134 頸椎の間欠牽引療法を座位で施行する場合、頸椎の牽引角度で最も適切なのはどれか。

1. 屈曲15度
2. 0度
3. 伸展15度
4. 伸展30度

次の文で示す症例について、はき 24-135、はき 24-136 の問いに答えよ。

「63 歳の男性。手のふるえ、歩行困難、歯車様の筋強剛がみられる。」

はき 24-135 本患者の特徴的な手のふるえはどれか。

1. コップをつかもうとするときのふるえ
2. ゆっくりと踊るようなふるえ
3. 丸薬を丸めるような手指のふるえ
4. 細かい指先のふるえ

はき 24-136 本患者の臓腑病証に基づいて九刺による鍼治療を行う場合の組合せで適切なのはどれか。

1. 肺 兪 ——— 太 淵
2. 肝 兪 ——— 太 衝
3. 脾 兪 ——— 太 白
4. 心 兪 ——— 神 門

次の文で示す症例について、はき 24-137、はき 24-138 の問いに答えよ。

「42 歳の男性。腹痛、腹部膨満感、食欲不振、軟便が 2 か月続いている。近医の診察で機能性胃腸症と言われた。ストレスが多い仕事に就いている。強いストレスがかかると症状が増悪する。舌苔は白膩。脈は弦。」

はき 24-137 最も適切な病証はどれか。

1. 脾胃の病証
2. 脾腎の病証
3. 肝胃の病証
4. 肝脾の病証

はき 24-138 本患者の腹痛の性質はどれか。

1. 隠 痛
2. 脹 痛
3. 刺 痛
4. 酸 痛

次の文で示す症例について、はき 24-139、はき 24-140 の問いに答えよ。

「28 歳の女性。第一子を出産したが、乳房の張り感はなく、母乳の出が悪い。産後の疲労感はある。なお、出産時には出血量が多かった。顔色はくすんだ黄色、舌質は淡白、脈は虚細。」

はき 24-139 本症例で最も考えられる病証はどれか。

1. 陽 虚
2. 痰 飲
3. 血 瘀
4. 気血両虚

はき 24-140 本症例の乳汁分泌を促すために頻用されている経穴はどれか。

1. 地 機
2. 至 陰
3. 膻 中
4. 関 衝

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 23) 東洋医学臨床論	117～140
-----------------	---------

はき 23-117 次の文で示す患者の病証で最も適切なのはどれか。

「69歳の男性。主訴は呼吸促迫。冬になると症状が増悪する。少し動くだけで息切れが起こる。手足は冷たく、淡は希薄で色は白っぽい。舌質は淡白、脈は弱。」

1. 気 虚
2. 血 虚
3. 陰 虚
4. 陽 虚

はき 23-118 鍼施術が有効な睡眠障害で最も適切なのはどれか。

1. 閉塞性無呼吸症候群
2. レム睡眠行動障害
3. 交替勤務性睡眠障害
4. 単純性睡眠障害

はき 23-119 神経痛と局所治療穴の組合せで正しいのはどれか。

1. 大後頭神経痛 —— 天 柱
2. 小後頭神経痛 —— 脳 戸
3. 大耳介神経痛 —— 聴 会
4. 眼神経痛 ———— 四 白

はき 23-120 中指背側の痛みを認める患者に対し、罹患部のデルマトームを考慮した治療穴で適切なのはどれか。

1. 手三里
2. 外 関
3. 消 瀲
4. 少 海

はき 23-121 次の文で示す症例で最も疑うべき障害部位はどれか。

「68歳の女性。主訴は左殿部の痛み。ローゼル・ネラトン線を指標とした検査で左側に異常を認めた。ニュートンテスト陰性。」

1. 股関節
2. 恥骨結合
3. 仙腸関節
4. 腰椎椎間関節

はき 23-122 シェーグレン症候群のドライマウスに対する低周波鍼通電療法の刺鍼部位で最も適切なのはどれか。

1. 翳風と下関
2. 陽白と瞳子髎
3. 頷厭と率谷
4. 完骨と天柱

はき 23-123 次の文で示す症例について、障害部位と経脈流注を考慮して行う治療穴で適切なのはどれか。
「35歳の女性。左側の第1指から第3指の指腹にしびれを感じる。患者の両手背を合わせ手関節の掌屈を強制させると、数秒後に手指のしびれが増強した。」

1. 通里
2. 郄門
3. 会宗
4. 温溜

はき 23-124 絞扼性神経障害について罹患神経と筋の組合せで正しいのはどれか。

1. 腕神経叢 ——— 肩甲挙筋
2. 正中神経 ——— 円回内筋
3. 橈骨神経 ——— 長掌筋
4. 尺骨神経 ——— 母指対立筋

はき 23-125 次の文で示す患者への初期対応で適切でないのはどれか。

「86歳の女性。8月の日中に開かれたゲートボール大会でめまい感、悪心、軽い頭痛を訴えた。発汗量は少ない。バイタルサインに異常は認めない。」

1. 木陰に寝かせる。
2. 鼠径部に氷のうを当てる。
3. 自動体外式除細動器(AED)を使う。
4. スポーツドリンクを飲ませる。

はき 23-126 次の文で示す症例について、施術対象となる椎間関節部位で最も適切なのはどれか。

「19歳の男性。体操競技選手。体幹のひねり動作時に腰部に違和感を訴え、近医にて分離すべり症と診断された。母趾の背屈力が弱い。」

1. L2-L3間
2. L3-L4間
3. L4-L5間
4. L5-S1間

はき 23-127 次の文で示す症例に対する鍼施術で治療対象となる筋はどれか。

「17歳の女子。陸上部の長距離選手。練習開始時、脛骨内側縁の中1/3と下1/3の境界付近に軽い痛みを覚えるようになったが、日常生活に支障はない。エックス線像に異常は認めない。」

1. 長母指伸筋
2. 前脛骨筋
3. ヒラメ筋
4. 長腓骨筋

はき 23-128 消穀善飢を伴う消渴病の食事療法について、最も摂取を控えなければならない味はどれか。

1. 酸 味
2. 苦 味
3. 甘 味
4. 辛 味

次の文で示す症例について、はき 23-129、はき 23-130 の問いに答えよ。

「51 歳の女性。主訴は股関節の痛み。痛みのため台所の立ち仕事が多く続けられない。近医にて変形性股関節症と診断された。」

はき 23-129 パトリックテストの操作として適切なものはどれか。

1. 右の股関節を 90 度屈曲位に保ったまま膝だけを伸展させる。
2. 右膝を胸に近づけるように股関節と膝を深く曲げる。
3. 右足を左膝の上に乗せ股関節を開排させた後、右膝の内側を下方に押す。
4. 右足を左膝の外側にもっていき右膝の外側を健側方向に押す。

はき 23-130 この患者に勧める運動指導で最も適切なものはどれか。

1. 散 歩
2. 水中歩行
3. ラジオ体操
4. スクワット

はき 23-131 次の文で示す患者の患側に対する低周波鍼通電療法の刺鍼部位で最も適切なものはどれか。

「48 歳の女性。右側の立脚相で明らかな左骨盤の沈下を認める。」

1. 盲 門と腰 眼
2. 次 髎と膀胱俞
3. 維 道と足五里
4. 居 髎と環 跳

はき 23-132 湿熱式ホットパックの用法について正しいのはどれか。

1. 80℃のお湯で加温したものをを用いる。
2. 患部との間に 2, 3 枚のバスタオルを挟む。
3. 全体をビニールで包みタオルにのせる。
4. 治療時間は 5 分を目安とする。

次の文で示す病証について、はき 23-133、はき 23-134 の問いに答えよ。

「38 歳の女性。転職をきっかけに月経痛が増悪した。仕事が忙しくなるとイライラして症状もひどくなる。鍼灸院で肝気鬱結と言われた。」

はき 23-133 最も現れやすい所見はどれか。

1. 心下痞鞭
2. 視力減退
3. 梅核気
4. 緩脈

はき 23-134 本患者が次の文で示す経過をたどった。現在の病証はどれか。

「怒りの程度が徐々に激しくなり、自分で制御できなくなっていたが、その後、一旦治まり、それとともに目のかすみや手足のほてり、腰痛を自覚するようになった。現在はそれらの症状とともに軽い怒りと頭部の脹痛を覚えるようになった。」

1. 肝血虚
2. 肝腎陰虚
3. 肝火上炎
4. 肝陽上亢

次の文で示す症例について、はき 23-135、はき 23-136 の問いに答えよ。

「35 歳の女性。左側の首の付け根付近のこり感が強い。大杼から上方に引いた線が僧帽筋上部線維の前縁を超えたところの陥凹部に顕著な圧痛・硬結を認めた。頸部の右側屈で左頸部外側から肩甲骨上角にかけて伸張痛がある。上肢症状はない。」

はき 23-135 罹患筋として最も適切なのはどれか。

1. 肩甲挙筋
2. 頭半棘筋
3. 中斜角筋
4. 小菱形筋

はき 23-136 本症例に低周波鍼通電療法を行う場合、陥凹部の圧痛・硬結部と組合せる刺鍼点として最も適切なのはどれか。

1. 風池
2. 肩井
3. 曲垣
4. 肩外兪

次の文で示す症例について、はき 23-137、はき 23-138 の問いに答えよ。

「65 歳の男性。1 か月前から右足の冷えと歩行中の痛みが出るようになった。休むと痛みが軽減し、再び歩くことができる。ただし、前屈み姿勢により痛みは変化しなかった。痛みの部位はふくらはぎと足底。動脈の触診では膝窩動脈の拍動を確認できたが、右側下腿の動脈拍動は減弱。」

はき 23-137 歩行中の痛みを起こす原因はどれか。

1. L₅神経根の刺激
2. 筋肉の虚血
3. 末梢神経の炎症
4. 筋肉の内圧上昇

はき 23-138 拍動の減弱を呈する動脈に向けた刺鍼で、足の冷えと痛みを治療するのに適切な経穴はどれか。

1. 衝 門
2. 委 中
3. 太 溪
4. 太 衝

次の文で示す患者について、はき 23-139、はき 23-140 の問いに答えよ。

「57 歳の女性。閉経は 54 歳。最近、顔のほてりと発汗が頻発し、耳鳴り、めまい、手足のほてり、腰部の重だるさ、肩こりを随伴し受診した。ホルモン検査で異常が指摘された。舌質は暗紅、舌苔は少なくやや乾燥。脈は細数。小腹不仁が認められた。」

はき 23-139 患者のホルモン検査で血中濃度が基準値より高いのはどれか。

1. エストラジオール
2. ゴナドトロピン
3. バソプレシン
4. プロスタグランジン F_{2a}

はき 23-140 患者の病証への治療方針で適切なのはどれか。

1. 心血を補う。
2. 肝陽を抑える。
3. 腎陰を補う。
4. 瘀血を除く。

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 22) 東洋医学臨床論	121～140
-----------------	---------

はき 22-121 痛みの性質と治療方針との組合せで最も適切なのはどれか。

1. 酸 痛 ——— 湿を除く。
2. 隠 痛 ——— 熱を除く。
3. 刺 痛 ——— 気を補う。
4. 脹 痛 ——— 血を補う。

はき 22-122 痛む所が定まらない患者に対しその部位を追いかけて次々と繰り返し刺鍼する十二刺はどれか。

1. 短 刺
2. 偶 刺
3. 報 刺
4. 兪 刺

はき 22-123 次の患者が示す症状に対し難経六十九難の治療法を用いる場合、適切な経穴はどれか。

「55 歳の女性。仕事の悩みから食欲不振が始まり、疲れやすく手足に力が入らない。脈は細。」

1. 隠 白
2. 大 都
3. 太 白
4. 公 孫

はき 22-124 次の文で示す患者の病証に対する治療方針として最も適切なのはどれか。

「18 歳の女性。2 週間前から耳鳴りがする。大学受験のため不安とイライラで情緒不安定となっている。顔が紅潮し、口が苦く咽の渇きを訴える。舌質は紅、脈は弦数。」

1. 血を補う。
2. 陽気を補う。
3. 痰湿を除く。
4. 肝火を除く。

はき 22-125 次の文で示す患者の病証に対する治療方針として適切なのはどれか。

「58 歳の女性。数年前から手足の冷えて悩んでいる。症状は雨の日にひどくなる。膝の重だるい痛みが常にある。舌苔は白膩。脈は濡。」

1. 気滞を除く。
2. 瘀血を除く。
3. 腎陰を補う。
4. 脾陽を補う。

はき 22-126 次の文で示す患者の病証に対する治療方針として除くべき外邪はどれか。

「55 歳の男性。風が強く吹く天候の中、ここ数日屋外で仕事をしていたら右上肢に痛みが出た。痛みは右の肩や肘、手首など定まっていない。疼痛部に冷えはない。舌苔は薄、脈は浮。」

1. 寒 邪
2. 風 邪
3. 湿 邪
4. 熱 邪

はき 22-127 徒手検査所見と罹患部への治療穴との組合せで適切なのはどれか。

1. ファレンテスト陽性 ————— 陽 池
2. トムゼンテスト陽性 ————— 間 使
3. グラスピングテスト陽性 ————— 膝陽関
4. K・ボンネットテスト陽性 ——— 大腸俞

はき 22-128 スポーツ障害と局所治療穴との組合せで最も適切なのはどれか。

1. ジャンパー膝 ————— 犢 鼻
2. ランナー膝 ————— 三陰交
3. シンスプリント ————— 陽陵泉
4. フットボールアングル ——— 膝 関

はき 22-129 絞扼部への治療穴として照海穴が最も適切なのはどれか。

1. 腓腹神経絞扼神経障害
2. ギヨン管症候群
3. 足根管症候群
4. モートン病

はき 22-130 局所治療穴として気戸穴が最も適切となる徒手検査所見はどれか。

1. モーリーテスト陽性
2. エデンテスト陽性
3. スパーリングテスト陽性
4. ヤーガソンテスト陽性

はき 22-131 鶏歩を呈する患者に対する麻痺筋への低周波鍼通電療法を行う部位で適切なのはどれか。

1. 足三里と豊 隆
2. 伏 兔と梁 丘
3. 漏 谷と三陰交
4. 合 陽と承 山

はき 22-132 次の文で示す患者の頭痛発作時に対する治療方針として最も適切なのはどれか。

「27歳の女性。最近、仕事が忙しくなり残業が続いている。時々、拍動性の頭痛が数時間から1日続く。発作には前兆があり羞明を伴う。医療機関を受診したが、器質的病変はみられなかった。」

1. 側頭筋の緊張を改善する。
2. 頭蓋外血管を収縮させる。
3. 頚椎のROMを広げる。
4. 大後頭神経支配領域の疼痛閾値を上げる。

次の文で示す症例について、はき 22-133、はき 22-134 の問いに答えよ。

「53歳の男性。3か月前から右腰下肢の痛みを感じる。右膝蓋腱反射の減弱と下腿内側に知覚鈍麻がみられる。整形外科にて腰椎椎間板ヘルニアと診断されている。」

はき 22-133 認められる徒手検査所見はどれか。

1. ニュートンテスト陽性
2. トーマステスト陽性
3. ブラガードテスト陽性
4. パトリックテスト陽性

はき 22-134 施術対象となる神経根で最も適切なのはどれか。

1. L3神経根
2. L4神経根
3. L5神経根
4. S1神経根

次の文で示す症例について、はき 22-135、はき 22-136 の問いに答えよ。

「35歳の女性。4年前からレイノー現象が出現し、最近では朝のこわばり、皮膚の硬化もみられるようになった。抗 Scl-70 抗体陽性。」

はき 22-135 本疾患でみられる所見はどれか。

1. ボタン穴変形
2. 鷲手
3. ヘバーデン結節
4. ソーセージ様指

はき 22-136 レイノー現象に対して局所への低周波鍼通電療法を行う部位で最も適切なのはどれか。

1. 諱諱と魂門
2. 浮郄と合陽
3. 液門と三間
4. 承光と絡却

次の文で示す症例について、はき 22-137、はき 22-138 の問いに答えよ。

「35 歳の女性。1 年前からめまい発作に苦しんでいる。めまいは、回転性で悪心・嘔吐を伴うこともある。他に難聴、耳鳴り、耳閉感がみられる。グリセロール検査陽性。舌診では胖大舌、白膩苔、脈は滑を呈した。」

はき 22-137 本症例の所見として最も適切なのはどれか。

1. 感音性難聴
2. 特定の頭位によるめまい発作
3. 失調性歩行
4. 温度眼振検査反応陽性

はき 22-138 病証に基づく治療方針として適切なのはどれか。

1. 肝陽の高ぶりを抑える。
2. 胃の気を降ろす。
3. 固摂作用を高める。
4. 湿痰を除く。

次の文で示す症例について、はき 22-139、はき 22-140 の問いに答えよ。

「33 歳の女性。疲労しやすく、抑うつ状態が続いている。肩こり、食欲不振を伴い、最近では早朝覚醒がみられる。他に時々喉が詰ったような違和感がある。舌は薄白苔、脈は弦脈を呈した。」

はき 22-139 本症例でみられやすい腹診所見はどれか。

1. 臍下不仁
2. 腹皮攣急
3. 胸脇苦満
4. 小腹急結

はき 22-140 病証に基づいた治療方針として適切なのはどれか。

1. 瘀血を除く。
2. 気滞を除く。
3. 血を補う。
4. 津液を補う。

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 21) 東洋医学臨床論	120～140
-----------------	---------

はき21-120 次の文で示す患者の病証に対する治療方針として最も適切なのはどれか。

「34歳の女性。主訴はめまい。病院でメニエール病と診断された。いつも頭が重くぼんやりし、四肢も重だるい。舌苔は厚膩、脈は滑。」

1. 気血を補う。
2. 肺陰を補う。
3. 胃気の上逆を抑える。
4. 痰濁を取り除く。

はき21-121 次の文で示す患者の病証に対する治療方針として最も適切なのはどれか。

「63歳の男性。主訴は不眠。就寝しても手足がほてり、胸部の熱が煩わしくて落ち着かず、すぐに目が覚めてしまう。寝汗も多い。舌尖は紅、脈は細数。」

1. 肝血を補う。
2. 腎陽を養う。
3. 心火を降ろす。
4. 胃熱を除く。

はき21-122 次の文で示す患者の病証に対する治療方針として最も適切なのはどれか。

「40歳の男性。下腹部の痛みを伴う癰閉がある。口渇はあるが、あまり水を飲む気はしない。舌質は紅、舌苔は黄膩、脈は滑数。」

1. 湿熱の除去
2. 気滞の除去
3. 腎精の回復
4. 固摂機能の回復

はき21-123 次の文で示す患者の病証に対して難経六十九難の治療原則に基づく治療穴はどれか。

「35歳の男性。寒くなると鼻水が出る。鼻汁の量は多く、色は白く、多少粘つくが臭いはない。風邪を引きやすく、喘息傾向にある。舌苔は薄白、脈は緩弱。」

1. 尺 沢
2. 経 渠
3. 太 淵
4. 少 商

はき21-124 理学検査所見と罹患部への治療穴との組合せで適切なのはどれか。

1. ファレンテスト陽性 ————— 陽 谷
2. フィンケルスタインテスト陽性 ——— 偏 歴
3. ペインフルアークサイン陽性 ——— 魄 戸
4. アドソンテスト陽性 ————— 雲 門

はき21-125 局所治療穴として小海穴が最も適切な理学検査所見はどれか。

1. ヤーガソンテスト陽性
2. ダウバーン徴候陽性
3. チェアテスト陽性
4. ティネル徴候陽性

はき21-126 肩こりに対する頸肩部の鍼治療を行う場合、脳虚血を起こしやすい体位はどれか。

1. 座位
2. 背臥位
3. 腹臥位
4. 側臥位

はき21-127 緊張型頭痛に対する局所治療について、罹患筋と治療穴との組み合わせで正しいのはどれか。

1. 頭板状筋 ———— 脳 空
2. 側頭筋 ———— 率 谷
3. 後頭筋 ———— 風 池
4. 僧帽筋 ———— 玉 枕

はき21-128 脳血管障害後遺症による顔面神経麻痺に対する局所治療穴として、適切でないのはどれか。

1. 陽 白
2. 四 白
3. 顴 膠
4. 地 倉

はき21-129 棘上筋のこりに対して鍼通電療法を行う場合、刺鍼部位の組合せとして最も適切なのはどれか。

1. 天 柱 ———— 肩 井
2. 秉 風 ———— 曲 垣
3. 臑 兪 ———— 天 宗
4. 臂 臑 ———— 肩 貞

はき21-130 野球選手の慢性期の肩インピンジメント症候群に対する局所治療穴で、最も適切なのはどれか。

1. 肩 貞
2. 肩 髃
3. 肩 井
4. 肩外兪

はき21-131 次の文で示す患者の病態に対し、罹患局所への施術対象となる神経根で最も適切なのはどれか。
「35歳の男性。腰椎椎間板ヘルニアを発症し、腰下肢痛がある。患側では長母指屈筋の筋力低下、足底部に知覚鈍麻がみられる。アキレス腱反射は減弱。」

1. L3神経根
2. L4神経根
3. L5神経根
4. S1神経根

はき21-132 鷲足を構成する筋の緊張を取るのに最も適切な治療穴はどれか。

1. 陰 包
2. 梁 丘
3. 委 中
4. 血 海

次の文で示す症例について、はき21-133、はき21-134の間に答えよ。

「28歳の女性。日頃から便秘気味だが月経後に症状はひどくなる。便意はあるが排便困難で、便が少し出るだけである。顔や唇、爪の血色は悪く、倦怠感やめまいがする。脈は細。」

はき21-133 この患者の舌所見として最も考えられるのはどれか。

1. 淡白舌
2. 淡紅舌
3. 紅 舌
4. 紫 舌

はき21-134 この患者の病証に対する治療方針として最も適切なのはどれか。

1. 虚熱を除く。
2. 痰濁を除く。
3. 気血を補う。
4. 津液を補う。

次の文で示す患者について、はき21-135、はき21-136の間に答えよ。

「50歳の男性。長年、バドミントンを続けているが、最近バックハンド時に肘に痛みを自覚する。局所の熱感・腫脹はないが、筋の過緊張と圧痛がみられる。」

はき21-135 病態の確認を目的として行う理学検査で最も適切なのはどれか。

1. イーテンテスト
2. ライトテスト
3. スピードテスト
4. トムゼンテスト

はき21-136 罹患筋への治療穴として適切なのはどれか。

1. 尺 沢
2. 曲 沢
3. 支 正
4. 手三里

次の文で示す症例について、はき21-137、はき21-138の間に答えよ。

「23歳の女性。主訴は月経痛。下腹部の脹ったような痛みで月経血に血塊がみられる。下腹部を押すと痛みが増強。舌診では淡白舌、舌苔剥離、脈診では弦脈を呈した。」

はき21-137 病証に基づく治療方針として最も適切なのはどれか。

1. 肝気の不足を補う。
2. 肝血の不足を補う。
3. 肝気の滞りを除く。
4. 肝陽の上亢を抑える。

はき21-138 月経痛の痛み治療としてゲートコントロール理論に基づく鍼通電療法で適切な組み合わせはどれか。

1. 次 髎 ————— 下 髎
2. 腎 兪 ————— 大腸兪
3. 脾 兪 ————— 三焦兪
4. 膈 兪 ————— 肝 兪

次の文で示す症例に対して、はき21-139、はき21-140の間に答えよ。

「53歳の女性。クッキーを食べたとき唾液の分泌が悪いのに気付いた。最近涙の分泌も悪く眼球乾燥もある。シルマー試験は陽性で、免疫血清検査の抗Ro/SS-A抗体、抗La/SS-B抗体も陽性であった。」

はき21-139 最も考えられる疾患はどれか。

1. ベーチェット病
2. 全身性硬化症
3. 全身性エリテマトーデス
4. 原発性シェーグレン症候群

はき21-140 唾液、涙の分泌改善を目的に支配神経の近傍に刺鍼を行う場合、適切な経穴はどれか。

1. 天 柱
2. 翳 風
3. 風 池
4. 秉 風

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 20) 東洋医学臨床論	119～140
-----------------	---------

はき 20-119 次の文で示す患者の病証に対する治療で、改善が期待されるのはどれか。

「32 歳の女性。主訴は肩こり。触診では肋骨弓下縁に張りがあり、指を入れると痛む。また、イライラしやすく、月経不順もみられる。脈は弦。舌質は暗紅。」

1. 統血作用
2. 疏泄作用
3. 宣発作用
4. 藏精作用

はき 20-120 次の文で示す患者の病証に対する治療方針として最も適切なのはどれか。

「35 歳の男性。夏バテしたためか、ここ数日食欲がない。空腹感や口渇感はあるが、実際に食べようとする時に食が進まない。腹痛や悪心はないが唇が乾燥している。舌質は紅、舌苔は少、脈は細数。」

1. 胃陰を補う。
2. 腎陰を補う。
3. 痰濁を除く。
4. 気滞を除く。

はき 20-121 命門火衰による陽萎に対し、経脈を考慮した施術を行う場合、最も適切なのはどれか。

1. 督脈と肺経
2. 心経と脾経
3. 大腸経と胃経
4. 腎経と任脈

はき 20-122 次の文で示す患者の病証について難経六十九難の治療原則に基づく治療穴はどれか。

「42 歳の女性。1 年前に 4 人目の子供を出産してから月経周期が乱れ、経血量も減少した。最近では疲れやすく、抜け毛も増えた。舌質は淡、舌苔は薄、脈は沈弱。」

1. 湧 泉
2. 太 溪
3. 然 谷
4. 復 溜

はき 20-123 次の文で示す患者の病態に対し、最も適切な施術はどれか。

「5 歳の男児。夜間の遺尿が続いている。日中は尿意切迫がある。」

1. 頭部への灸頭鍼
2. 腹部への糸状灸
3. 仙骨部への接触鍼
4. 会陰部への単刺

はき 20-124 五行穴を用いて施術する場合、症状と治療穴との組合せで最も適切なのはどれか。

1. のぼせ・下痢 — 湧 泉
2. 咳を伴う悪寒発熱 — 經 渠
3. 心下部の膨満感 — 大 陵
4. 全身の熱感 — 少 海

はき 20-125 施術中に患者の訴える痛みの部位が移動し一定しない。このような場合に十二刺の刺法で適切なのはどれか。

1. 報 刺
2. 偶 刺
3. 斉 刺
4. 揚 刺

はき 20-126 バックハンド型テニス肘の患者に対する局所治療穴で適切なのはどれか。

1. 曲 池
2. 尺 沢
3. 曲 沢
4. 少 海

はき 20-127 次の文で示す患者に対する局所治療穴で最も適切なのはどれか。

「28 歳の男性。半年程前から右薬指のしびれが徐々に強くなってきた。母指と示指で紙を挟もうとすると母指の指節間関節が曲がる。小学 5 年生の時に右肘骨折の既往がある。」

1. 手三里
2. 大 陵
3. 通 里
4. 孔 最

はき 20-128 絞扼性神経障害と局所治療穴との組み合わせで正しいのはどれか。

1. 梨状筋症候群 — 膀胱俞
2. 足根管症候群 — 太 溪
3. 肘部管症候群 — 曲 沢
4. 手根管症候群 — 陽 溪

はき 20-129 次の文で示す患者の罹患筋に対する局所治療穴で最も適切なのはどれか。

「35 歳の女性。フルタイムの事務職。右の首から肩にかけての慢性的なこり感がある。1 か月前から右の小指にしびれを自覚するようになった。右側のモーリーテスト陽性、ジャクソンテスト陰性。」

1. 風 池
2. 天 柱
3. 天 窓
4. 天 容

はき 20-130 直刺で刺鍼する場合、気胸を起こす危険性が最も高い経穴はどれか。

1. 曲 垣
2. 臍 兪
3. 定 喘
4. 魄 戸

はき 20-131 次の文で示す患者に対する治療方針で最も適切なのはどれか。

「21 歳の女性。2 か月前から就職活動がうまくいかず、腹部膨満感がある。食後すぐに便意を催し、1 日に 5 回以上の水様性の下痢が続く。病院での検査所見では異常はみられなかった。」

1. 迷走神経の機能抑制
2. 大内臓神経の機能抑制
3. 内臓知覚神経の機能亢進
4. 腸骨下腹神経の機能亢進

はき 20-132 スポーツ傷害と罹患筋に対する経穴との組合せで適切なのはどれか。

1. 足関節内がえし捻挫 — 三陰交
2. ジャンパー膝 — 足三里
3. アキレス腱炎 — 懸 鍾
4. シンスプリント — 漏 谷

はき 20-133 次の文で示す患者の病態に対し、施術対象となる罹患神経根として最も適切なのはどれか。

「45 歳の男性。荷物の搬送作業中に急に腰に激痛が走り、右下腿の前側から足背にしびれが出てきた。右足関節背屈時の筋力低下と足背に知覚鈍麻がみられる。膝蓋腱反射とアキレス腱反射は正常。」

1. L3 神経根
2. L4 神経根
3. L5 神経根
4. S1 神経根

はき 20-134 下腿の慢性コンパートメント障害で障害部位と局所治療穴との組合せで正しいのはどれか。

1. 前方コンパートメント — 外 丘
2. 外側コンパートメント — 豊 隆
3. 浅後方コンパートメント — 漏 谷
4. 深後方コンパートメント — 三陰交

はき 20-135 「18 歳の男子学生。小学生の頃からバスケットボールを 10 年間続けている。1 年前から腰痛がある。下肢症状はないが、L4-L5 の棘突起間に階段状変形を認める。」

最も考えられる疾患はどれか。

1. 腰部脊柱管狭窄症
2. 腰椎分離すべり症
3. 梨状筋症候群
4. 腰椎椎間板ヘルニア

はき 20-136 「18 歳の男子学生。小学生の頃からバスケットボールを 10 年間続けている。1 年前から腰痛がある。下肢症状はないが、L4-L5 の棘突起間に階段状変形を認める。」

罹患部に対する局所治療穴として最も適切な経穴はどれか。

1. 厥陰俞
2. 腎 俞
3. 大腸俞
4. 膀胱俞

はき 20-137 「20 歳の男性。社会人野球選手。連日バッティング練習を続けていたところ、グリップエンドが当たる左手根部に強い痛みを感じ、手に力が入りにくくなった。エックス線検査で骨折が認められた。現在、小指にしびれが残っている。」

骨折しているのはどれか。

1. 舟状骨
2. 月状骨
3. 大菱形骨
4. 有鉤骨

はき 20-138 「20 歳の男性。社会人野球選手。連日バッティング練習を続けていたところ、グリップエンドが当たる左手根部に強い痛みを感じ、手に力が入りにくくなった。エックス線検査で骨折が認められた。現在、小指にしびれが残っている。」

罹患神経に直接刺激を与えるのに最も適切な経穴はどれか。

1. 尺 沢
2. 曲 沢
3. 小 海
4. 天 井

はき 20-139 「38 歳の女性。3 年前に全身性硬化症と診断され、皮膚の硬化がみられる。レイノー現象の改善を目的に鍼治療を行うことになった。」

鍼治療の効果を評価する方法として最も適切なのはどれか。

1. サーモグラフィ
2. 単純エックス線
3. 筋電図
4. 脳 波

はき 20-140 「38 歳の女性。3 年前に全身性硬化症と診断され、皮膚の硬化がみられる。レイノー現象の改善を目的に鍼治療を行うことになった。」

レイノー現象の改善を目的とした局所への治療穴として適切なのはどれか。

1. 血 海
2. 中 渚
3. 正 営
4. 建 里

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 19) 東洋医学臨床論	119～140
-----------------	---------

はき 19-119 次の文で示す患者に対する奇経病証の治療で適切な経脈はどれか。

「30 歳の男性。昨日から背部が強ばり、後頭部に痛みがある。吐き気はない。」

1. 督 脈
2. 任 脈
3. 衝 脈
4. 帶 脈

はき 19-120 勃起障害（ED）に対し、流注を踏まえて施術する場合、最も適切な経脈はどれか。

1. 足の太陽経
2. 足の少陽経
3. 足の太陰経
4. 足の厥陰経

はき 19-121 五更泄瀉に対する治療方針で適切なのはどれか。

1. 肝血を補う。
2. 心陰を補う。
3. 肺気を補う。
4. 腎陽を補う。

はき 19-122 次の文で示す患者の病証について治療対象となる経脈で適切なのはどれか。

「7 歳の男児。夜間の遺尿がある。食欲不振があり、泥状便が観察される。舌質は淡、脈は沈細弱。」

1. 手の少陰経
2. 手の太陽経
3. 足の太陰経
4. 足の少陽経

はき 19-123 次の文で示す患者の病証について治療対象となる経脈で適切なのはどれか。

「30 歳の男性。半年前から便秘が続く。偏食傾向があり辛い物をよく食べる。腹部膨満感があり口臭も強い。舌質は紅、脈は滑実。」

1. 肺 経
2. 胃 経
3. 小腸経
4. 膀胱経

はき 19-124 次の文で示す患者の病能に古代刺法を適用する場合、適切なのはどれか。

「70歳の男性。脈の不整と共に動悸、息切れを自覚するようになった。」

1. 短 刺
2. 偶 刺
3. 陰 刺
4. 浮 刺

はき 19-125 次の文で示す患者の病証について難経六十九難の治療原則に基づく治療穴はどれか。

「46歳の女性。食欲不振で食後に膨満感がある。体がだるく、横になりたがる。」

1. 太 淵
2. 大 都
3. 復 溜
4. 曲 泉

はき 19-126 骨にあいている孔に気づかず臈中穴へ深く直刺した場合、損傷の可能性の最も高い器官はどれか。

1. 肺
2. 大動脈弓
3. 気管支
4. 心 臓

はき 19-127 下肢のしびれを訴え血液検査で空腹時血糖とHbA1Cが高値を示している患者の局所に施灸する場合、最も感染のリスクが高いのはどれか。

1. 知熱灸
2. 隔物灸
3. 焦灼灸
4. 棒 灸

はき 19-128 理学検査所見と局所治療穴との組合せで適切なのはどれか。

- | | |
|------------------|-------|
| 1. スピードテスト陽性 | — 臈 会 |
| 2. 中指伸展テスト陽性 | — 曲 沢 |
| 3. ボンネットテスト陽性 | — 風 市 |
| 4. 膝の外反ストレステスト陽性 | — 曲 泉 |

はき 19-129 ランニングによるオーバーユースが原因で、グラスピングテスト陽性となった患者に対する最も適切な局所治療穴はどれか。

1. 足三里
2. 足五里
3. 足陽関
4. 足通谷

はき 19-130 母指、小指の対立運動が困難となる運動麻痺に対し、罹患神経への局所治療穴として適切なのはどれか。

1. 郄 門
2. 支 正
3. 上 廉
4. 小 海

はき 19-131 神経痛と罹患神経に対する局所治療穴との組合せで正しいのはどれか。

1. 三叉神経第2枝痛 — 巨 髎
2. 大後頭神経痛 — 完 骨
3. 肋間神経痛 — 衝 門
4. 坐骨神経痛 — 伏 兔

はき 19-132 次の文で示す患者の罹患神経を対象として刺鍼する場合、適切な局所治療穴はどれか。

「50 歳の男性。右足底全体に痛みと焼けるようなピリピリした感覚がある。足背に症状はみられない。夜間痛があり、ティネル徴候陽性。」

1. 浮 郄
2. 委 中
3. 陽陵泉
4. 足三里

次の文で示す患者について、はき 19-133、はき 19-134 の問に答えよ。

「40 歳の女性。左手関節橈側に痛みがある。フライパンを使って調理する際に痛みが増強する。頸部や肩関節の動きでの増悪はない。疼痛部の知覚異常はみられない。」

はき 19-133 最も考えられる疾患はどれか。

1. 頸椎神経根症
2. 胸郭出口症候群
3. ドケルバン病
4. 手根管症候群

はき 19-134 罹患筋に対する局所治療穴はどれか。

1. 手三里
2. 孔 最
3. 偏 歴
4. 合 谷

次の文で示す患者について、はき 19-135、はき 19-136 の間に答えよ。

「27 歳の女性。月経が始まる数日前から頭痛やめまいが起こり、乳房に脹痛がある。不安やイライラがあるが月経開始と共に症状は消失する。不正性器出血や病的帯下はみられない。舌質は淡紅、舌苔は厚、脈は弦。」

はき 19-135 最も考えられる疾患はどれか。

1. 子宮内膜症
2. 子宮筋腫
3. 月経困難症
4. 月経前緊張症

はき 19-136 病証に基づいた治療方針で最も適切なのはどれか。

1. 気滞を除く。
2. 湿熱を除く。
3. 陽気を補う。
4. 肝血を補う。

次の文で示す症例について、はき 19-137、はき 19-138 の間に答えよ。

「69 歳の女性。10 年前から、めまい発作が頻繁に出現している。耳鳴り及び難聴を伴う回転性のめまい発作で眼振も伴う。」

はき 19-137 めまいの原因として最も考えられるのはどれか。

1. 前庭神経炎
2. 良性発作性頭位めまい症
3. 突発性難聴
4. メニエール病

はき 19-138 めまいは大都への鍼刺激で軽快した。大都について正しいのはどれか。

1. 栄火穴である。
2. 肝経に属する。
3. 難経六十九難に基づけば実証で用いる。
4. 足内側、第 1 中足指節関節の近位陥凹部に取る。

次の文で示す症例について、はき 19-139、はき 19-140 の間に答えよ。

「56 歳の男性。半年前から右肩関節の痛みが出現した。肩のエックス線検査では異常はない。1 か月前から夜間痛はなくなり、肩関節の外転、外旋時に軽度の痛みが出現する。肩甲上腕リズムの異常が著明である。スピードテスト陰性、ドロップアームサイン陰性。」

はき 19-139 最も考えられる疾患はどれか。

1. 石灰沈着性腱板炎
2. 上腕二頭筋長頭腱炎
3. いわゆる五十肩
4. 腱板断裂

はき 19-140 疼痛軽減を目的とした局所治療穴で適切なのはどれか。

1. 中 府
2. 臑 兪
3. 天 泉
4. 肘 髎

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 18) 東洋医学臨床論	119～140
-----------------	---------

はき 18-119 実熱証に対する刺法で適切なのはどれか。

1. 疾く刺入し、疾く抜鍼する。
2. 呼気時に刺入し、吸気時に抜鍼する。
3. 経絡の流注に沿って刺入する。
4. 浅く刺入し、後に深くする。

はき 18-120 次の文で示す患者の病証に対し、五臓の病に用いる経穴で適切なのはどれか。

「50 歳の男性。最近、毛髪が多く抜け落ち、細く柔らかくなった。頭皮は脂が多い。耳鳴りや腰のだるさもある。脈は細数。」

1. 太 淵
2. 太 白
3. 太 溪
4. 大 陵

はき 18-121 次の文で示す患者の病証に対する治療方針で適切なのはどれか。

「35 歳の女性。日頃から前頭部に頭重感があり、頭がぼんやりする。胃のつかえ感、泥状便を伴う。舌苔は白膩、脈は滑。」

1. 陽気を補う。
2. 津液を補う。
3. 瘀血を改善する。
4. 痰濁を除く。

はき 18-122 次の文で示す患者の病証に対する治療方針で適切なのはどれか。

「45 歳の女性。疲労時に腹痛が起こり、冷えると増悪する。倦怠感があり、便は水様性。舌質は淡、脈は沈細。」

1. 肝陰を補う。
2. 脾陽を補う。
3. 肺気を補う。
4. 腎陰を補う。

はき 18-123 急性の胃痛に対して要穴を用いる場合、適切なのはどれか。

1. 陰 谷
2. 梁 丘
3. 飛 陽
4. 足竅陰

はき 18-124 次の文で示す患者の病証に対し、治療対象となる経脈で適切なのはどれか。

「28 歳の女性。1 年前から月経周期が不規則で月経量は少ない。乳房脹痛、月経痛がある。月経前から月経中にかけて抑うつがある。」

1. 足陽明経
2. 足太陰経
3. 足太陽経
4. 足厥陰経

はき 18-125 次の文で示す患者の病態に対し五腧穴の主治を考慮して施術を行う場合、最も適切な経穴はどれか。「45 歳の女性。右肩関節の後面に痛みがあり、右上肢後内側に放散痛がみられる。」

1. 前 谷
2. 後 溪
3. 陽 谷
4. 小 海

はき 18-126 半腱様筋の痛みに対し、五刺の刺法を用いて施術する場合、適切な部位はどれか。

1. 大転子部
2. 腓骨頭部
3. 鵞足部
4. 脛骨粗面部

はき 18-127 理学検査所見と病態に対する局所治療穴との組合せで適切でないのはどれか。

1. ペインフルアークサイン陽性 — 天 府
2. 中指伸展テスト陽性 — 曲 池
3. フィンケルスタインテスト陽性 — 陽 溪
4. フローマン徴候陽性 — 小 海

はき 18-128 理学検査所見と病態に対する局所治療穴との組合せで正しいのはどれか。

1. ニュートンテスト陽性 — 環 跳
2. パトリックテスト陽性 — 足三里
3. ブラガード徴候陽性 — 殷 門
4. 大腿神経伸展テスト陽性 — 浮 郄

はき 18-129 次の文で示す患者の病態に対し、罹患部へ局所治療を行う場合、適切な筋はどれか。

「20 歳の男性。ハードルの選手。練習中に右臀部に痛みを感じるようになった。股関節の他動的な内旋によって痛みは増強する。」

1. 大腿方形筋
2. 大腿筋膜張筋
3. 中殿筋
4. 梨状筋

はき 18-130 シンスプリントの罹患部に対する局所治療穴として適切なのはどれか。

1. 光 明
2. 三陰交
3. 承 山
4. 上巨虚

はき 18-131 顎関節症の開口障害に対する局所治療穴として適切なのはどれか。

1. 瞳子膠
2. 聴 宮
3. 浮 白
4. 迎 香

はき 18-132 下の歯の痛みの軽減を目的として循経取穴をする場合、適切な経穴はどれか。

1. 手三里
2. 足三里
3. 支 溝
4. 外 丘

次の文で示す患者について、はき 18-133、はき 18-134 の間に答えよ。

「70 歳の男性。3 か月前から歩行によって右下腿後面に締めつけられるような痛みが出現する。休息すると、姿勢にかかわらず痛みが軽減する。SLR テスト陰性、知覚検査異常なし。」

はき 18-133 最も考えられる疾患はどれか。

1. 腰部脊柱管狭窄症
2. 腰椎椎間板ヘルニア
3. 閉塞性動脈硬化症
4. 糖尿病性ニューロパチー

はき 18-134 この患者の病態に対する施術目的で最も適切なのはどれか。

1. 下肢の末梢循環改善
2. 下肢の筋力増強
3. 腰部の神経根圧迫の改善
4. 腰部の筋緊張改善

次の文で示す患者についてはき 18-135、はき 18-136 の間に答えよ。

「40 歳の男性。普段から鼻炎に悩まされ、息切れがある。子供の頃から風邪を引きやすく、寒がりである。舌質は淡。舌苔は薄白。脈は緩弱。」

はき 18-135 病証に基づいた治療方針で最も適切なのはどれか。

1. 肝血を補う。
2. 心血を補う。
3. 脾気を補う。
4. 肺気を補う。

はき 18-136 難經六十九難に基づく治療を行う場合、適切な経穴はどれか。

1. 大都・少府
2. 少衝・大敦
3. 太淵・太白
4. 曲泉・陰谷

次の文で示す症例について、はき 18-137、はき 18-138 の間に答えよ。

「21 歳の女性。最近、食思不振や発熱があり、次第に血便や腹痛を伴うようになった。痔瘻はない。内視鏡検査で縦走潰瘍、敷石状病変はみられなかった。普段から寒がり、冷たいものを飲食すると下痢が出現しやすい。手足が冷え、腰がだるい。舌質は淡白、脈は細くて弱い。」

はき 18-137 診断として最も考えられるのはどれか。

1. 潰瘍性大腸炎
2. クローン病
3. 過敏性腸症候群
4. 大腸ポリープ

はき 18-138 東洋医学からみた病証として適切なのはどれか。

1. 肝血虚証
2. 心陰虚証
3. 脾陽虚証
4. 肺気虚証

次の文で示す症例について、はき 18-139、はき 18-140 の間に答えよ。

「49 歳の男性。左耳痛で始まり、その後に外耳道、耳介周辺に水疱がみられ、同側の顔面が麻痺した。」

はき 18-139 最も考えられる疾患はどれか。

1. 耳下腺腫瘍
2. ベル麻痺
3. 三叉神経麻痺
4. ラムゼイハント症候群

はき 18-140 顔面筋を広範囲に刺激するのに最も適切な経穴はどれか。

1. 天 牖
2. 風 池
3. 翳 風
4. 完 骨

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 17) 東洋医学臨床論	119～140
-----------------	---------

はき 17-119 東洋医学的な治療原則として誤っている記述はどれか。

1. 春夏は深刺する。
2. 有余なるものは瀉す。
3. 緩なれば本を治す
4. 陷下するものは灸す。

はき 17-120 「逆子の灸」としてよく用いられる施灸部位はどれか。

1. 足の第4指外側爪甲根部
2. 足の第4指内側爪甲根部
3. 足の第5指外側爪甲根部
4. 足の第5指内側爪甲根部

はき 17-121 次の文で示す患者の病証に対し、適切な治療方針はどれか。

「40歳の男性。エビを食べたところ発疹が現われた。発疹は赤みを帯び膨隆もみられる。舌質は紅。舌苔は黄膩。脈は滑数。」

1. 風寒を除く。
2. 湿熱を除く。
3. 血を補う。
4. 津液を補う。

はき 17-122 次の文で示す患者の病証に対し、適切な治療方針はどれか。

「50歳の女性。3か月前から空腹感はあるが食欲がない。口は渇くが水を飲みたがらない。舌質は紅。無苔。脈は細数。」

1. 肝血を補う。
2. 心陽を補う。
3. 肺気を補う。
4. 胃陰を補う。

はき 17-123 次の文で示す患者の病証に対する刺法として適切なのはどれか。

「45歳の女性。冷感が足先から膝や腰まで上がり、下痢しやすい。」

1. 陰 刺
2. 浮 刺
3. 報 刺
4. 輸 刺

はき 17-124 次の文で示す患者の病証に対し、難経六十九難に基づく治療を行う場合、適切な経穴はどれか。

「32歳の男性。数年前から鈍い腹痛があり腹をさすると楽になる。倦怠感があり、泥状便がみられる。」

1. 侠 溪・足通谷
2. 少 衝・大 敦
3. 大 都・少 府
4. 太 淵・太 白

はき 17-125 下垂足を呈する不全麻痺に対して上巨虚穴と条口穴に鍼通電療法を行った場合、目的とする筋に鍼が刺入されていることを確認する足関節の動きはどれか。

1. 外反・屈曲（底屈）
2. 外反・伸展（背屈）
3. 内反・屈曲（底屈）
4. 内反・伸展（背屈）

はき 17-126 運動による筋肉痛に対して局所施術を行う場合、罹患筋と治療穴との組合せで適切でないのはどれか。

1. 三角筋 — 肩 髃
2. 上腕三頭筋 — 消 灤
3. 半腱様筋 — 中 瀆
4. 後脛骨筋 — 三陰交

はき 17-127 肩こりを訴える患者に対し、肩甲挙筋の緊張緩和を目的に罹患筋起始部へ刺鍼する場合、適切なのはどれか。

1. 外後頭隆起部
2. 乳様突起部
3. 第3頸椎横突起部
4. 第6頸椎横突起部

はき 17-128 次の文で示す患者の病態に対し、罹患局所への施術部位として適切なのはどれか。

「39歳の男性。友人の引っ越し作業を手伝った後、肩関節前面の痛みを自覚するようになった。外転外旋時に痛みが強い。ヤーガソンテスト陽性。」

1. 烏口突起部
2. 結節間溝部
3. 棘下部
4. 肩甲骨下角部

はき 17-129 次の文で示す患者の病態に対し、罹患部への局所治療穴として適切なのはどれか。

「62歳の男性。前腕尺側に痛みがあり、薬指・小指にしびれがある。上腕骨外顆骨折の既往があり、フローマン徴候陽性。」

1. 小 海
2. 曲 池
3. 天 井
4. 孔 最

はき 17-130 トレンデレンブルグ徴候を呈する場合、罹患局所への治療部位として最も適切なのはどれか。

1. 第3腰椎棘突起周囲
2. 大転子周囲
3. 膝蓋骨周囲
4. 踵骨周囲

はき 17-131 次の文で示す患者の病態に対し、罹患部への局所治療穴として適切なのはどれか

「23歳の女性。バレーボール選手。スパイクの着地時に膝前面が痛む。」

1. 委陽
2. 曲泉
3. 犢鼻
4. 陽陵泉

はき 17-132 腰椎椎間関節部への施術の必要性を示す理学検査所見はどれか。

1. ケンプ徴候陽性
2. ニュートンテスト陽性
3. パトリックテスト陽性
4. ボンネットテスト陽性

次の文で示す患者について、はき 17-133、はき 17-134 の問に答えよ。

「55歳の男性。3か月前より右耳の後ろから側頭部にかけてピリッとした電撃様の痛みが起こる。めまい、嘔気はない。」

はき 17-133 最も考えられるのはどれか。

1. 三叉神経第1枝痛
2. 片頭痛
3. 緊張型頭痛
4. 小後頭神経痛

はき 17-134 罹患部への局所治療穴として適切なのはどれか。

1. 完骨
2. 天柱
3. 下関
4. 百会

次の文で示す患者について、はき 17-135、はき 17-136 の間に答えよ。

「28 歳の女性。11 月頃より肩甲部から上肢にかけて重だるさと痛みが出現した。また食後の腹脹と下痢がある。寒冷により症状は増強し、温めると軽減する。」

はき 17-135 痺証とした場合、適切なのはどれか。

1. 行 痺
2. 痛 痺
3. 着 痺
4. 熱 痺

はき 17-136 施術対象として適切な経脈はどれか。

1. 肺 経
2. 三焦経
3. 心包経
4. 小腸経

次の文で示す患者について、はき 17-137、はき 17-138 の間に答えよ。

「35 歳の男性。肩痛に対する鍼治療を受けた後から咳、胸痛、呼吸困難、冷汗が出現した。音声振盪が減弱している。」

はき 17-137 最も優先されるべき検査はどれか。

1. 胸部エックス線検査
2. 呼吸機能検査
3. 超音波検査
4. 心電図検査

はき 17-138 「深く刺しすぎると呼吸困難を引き起こす」と指摘されている経穴はどれか。

1. 巨 骨
2. 天 宗
3. 肩 井
4. 肩 髃

次の文で示す患者について、はき 17-139、はき 17-140 の間に答えよ。

「55 歳の男性。主訴は左腰痛。体幹の後屈時に痛みが増強し、左殿部に放散痛がみられる。L4-L5 棘突起間外側 2cm の部の圧痛、SLR テスト陰性、膝蓋腱反射・アキレス腱反射正常、L2-S1 の知覚検査異常なし。」

はき 17-139 放散痛を引き起こす可能性の最も高いのはどれか。

1. 脊髄神経後枝内側枝
2. 脊椎洞神経
3. 交感神経
4. 神経根

はき 17-140 罹患部への鍼治療として最も適切な刺鍼部位はどれか。

1. 多裂筋
2. L4-L5 間の棘間靱帯
3. 下部腰椎椎間関節部
4. L5 神経根

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 16) 東洋医学臨床論	119～140
-----------------	---------

はき 16-119 腹証とその局所への治療穴との組合せで誤っているのはどれか。

1. 心下痞硬 — 巨 闕
2. 胸脇苦満 — 期 門
3. 腹裏拘急 — 天 枢
4. 小腹不仁 — 下 脘

はき 16-120 次の文で示す患者の病証に対する治療で適切なものはどれか。

「5歳の男児。睡眠中に遺尿し、目覚めてから気がつく。排尿量は比較的多く、四肢が冷える。舌質は淡、脈は沈遅。」

1. 脾気を補う。
2. 腎陽を補う。
3. 心血を補う。
4. 肝陰を補う。

はき 16-121 次の文で示す患者の病証に対する治療で適切でないのはどれか。

「45歳の男性。日頃から頭痛、耳鳴りがあり、怒ると症状が悪化する。顔面紅潮、口が苦く、寝汗を伴う。舌質は紅、脈は弦数。」

1. 足の陽明経を補う。
2. 足の少陰経を補う。
3. 足の少陽経を瀉す。
4. 足の厥陰経を瀉す。

はき 16-122 頸肩腕痛を伴う療証で、脾胃の運化機能の改善と湿の除去を治療方針とするのはどれか。

1. 行 痺
2. 痛 痺
3. 着 痺
4. 熱 痺

はき 16-123 次の文で示す患者の病証に対し、補法を行う経穴はどれか。

「65歳の女性。奥歯が浮いたような感じで鈍痛がある。症状は夜間に強くなる。歯肉の発赤は軽度。耳鳴りを伴う。」

1. 太 衝
2. 太 溪
3. 太 白
4. 大 陵

はき 16-124 次の文で示す患者の病証に対する治療方針で、最も適切なのはどれか。

「58 歳の管理職女性。胸部に刺すような痛みがあり、夜間に増強する。唇は紫色。脈は結代。」

1. 痰濁を除く。
2. 瘀血を改善する。
3. 陽気を補う。
4. 津液を補う。

はき 16-125 次の文で示す患者の病証に対し、難経六十九難に基づく治療穴はどれか。

「30 歳の女性。半年前から月経痛があり、月経血量が少ない。月経周期は不規則で、不眠、めまい、目のかすみを伴う。」

1. 曲 泉・陰 谷
2. 太 淵・太 白
3. 大 都・少 府
4. 復 溜・経 渠

はき 16-126 大後頭神経痛に対し、罹患神経への局所治療穴として適切なのはどれか。

1. 玉 枕
2. 風 池
3. 完 骨
4. 天 牖

はき 16-127 次の文で示す患者の病態に対応する局所施術部位で適切なのはどれか。

「60 歳の男性。3 か月前より左の頸肩部から中指にかけて痛みがある。頸を左に側屈すると症状が再現する。左上腕三頭筋腱反射減弱。」

1. C4－C5 横突起間
2. C5－C6 横突起間
3. C6－C7 横突起間
4. C7－Th1 横突起間

はき 16-128 肩関節周囲炎で肩関節外転・外旋時に痛みを訴える患者に対する罹患筋の局所治療穴で適切でないのはどれか。

1. 中 府
2. 臑 兪
3. 秉 風
4. 天 宗

はき 16-129 次の文で示す患者の病態に対し、罹患局所への刺鍼部位として適切なのはどれか。

「50 歳の男性。2 か月前より右腰から殿部にかけて痛む。体幹の前屈時痛はないが、右斜め後ろに反らせた時、痛みが出現する。腰部正中より右外方約 2cm に圧痛がある。」

1. 右腰方形筋
2. 右腸肋筋
3. 右腰椎椎間関節
4. 右仙腸関節

はき 16-130 次の文で示す患者の病態に対し、罹患部への局所治療穴として適切なのはどれか。

「65歳の女性。半年前から動作開始時および歩行時に左膝関節内側部に痛みが出現する。」

1. 足三里
2. 陽陵泉
3. 梁 丘
4. 曲 泉

はき 16-131 末梢神経麻痺による症状と罹患神経を対象とした治療穴との組合せで正しいのはどれか。

1. 下垂手 — 郄 門
2. 驚 手 — 小 海
3. 下垂足 — 委 中
4. 鉤 足 — 陽陵泉

はき 16-132 僧帽筋上部線維の緊張緩和を目的として鍼通電療法を行う場合、刺鍼部位の組合せで最も適切なのはどれか。

1. 肩 井 — 天 柱
2. 翳 風 — 風 池
3. 天 宗 — 心 俞
4. 肩 髃 — 膈 俞

次の文で示す患者について、はき 16-133、はき 16-134 の間に答えよ。

「22歳の男性。テニスの選手。バックハンドストロークの際に肘に痛みを自覚する。」

はき 16-133 病態の確認を目的として行う理学検査で適切でないのはどれか。

1. トムゼンテスト
2. 中指伸展テスト
3. チェアテスト
4. ファレンテスト

はき 16-134 罹患筋への局所治療穴として適切なのはどれか。

1. 少 海
2. 手三里
3. 神 門
4. 尺 沢

次の文で示す患者について、はき 16-135、はき 16-136 の間に答えよ。

「50 歳の女性。3 年前から喘鳴を伴う発作性の呼吸困難がある。全身倦怠感があり、腰がだるく、四肢の冷えがみられ、稀薄な痰がでる。舌質は淡、脈は沈細。」

はき 16-135 気血の病証で適切なのはどれか。

1. 血 虚
2. 血 瘀
3. 気 虚
4. 気 滞

はき 16-136 治療方針として適切なのはどれか。

1. 肝腎を補う。
2. 心脾を補う。
3. 脾胃を補う。
4. 肺腎を補う。

次の文で示す患者について、はき 16-137、はき 16-138 の間に答えよ。

「65 歳の男性。主訴は左下肢痛。平地を 200m ほど歩くと足が痛み、歩けなくなる。しばらく休むとまた歩くことができる。検査所見では左下肢動脈拍動減弱、ケンプ徴候陰性、膝蓋腱反射正常である。」

はき 16-137 本症例でみられるのはどれか。

1. 前傾姿勢で休息すると楽になる。
2. 痛みは髄節性である。
3. 下腿の知覚が鈍い。
4. 下肢の冷感がある。

はき 16-138 下肢動脈拍動の触診部位としての経穴と動脈との組合せで適切でないのはどれか。

1. 気 衝 — 大腿動脈
2. 委 中 — 膝窩動脈
3. 太 溪 — 後脛骨動脈
4. 太 衝 — 足背動脈

次の文で示す患者について、はき 16-139、はき 16-140 の間に答えよ。

「65 歳の男性。主訴は動作緩慢と振戦で上肢に歯車様固縮がみられる。不眠、抑うつ、便秘を伴い、舌質はやや淡白、脈状は細弱を呈する。」

はき 16-139 本症例でみられる異常歩行はどれか。

1. 痙性歩行
2. トレンデレンブルグ歩行
3. 小刻み歩行
4. 失調性歩行

はき 16-140 治療対象となる適切な病証はどれか。

1. 肝血虚証
2. 心血虚証
3. 脾陽虚証
4. 腎陽虚証

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 15) 東洋医学臨床論	119～140
-----------------	---------

はき 15-119 腎気虚による小児夜尿症に対する治療目的として適切なのはどれか。

1. 固摂作用を高める。
2. 疏泄作用を高める。
3. 運化作用を高める。
4. 宣発（宣散）作用を高める。

はき 15-120 筋のひきつり・けいれんに対して八会穴を用いる場合、正しいのはどれか。

1. 大 杼
2. 膈 兪
3. 懸 鐘
4. 陽陵泉

はき 15-121 次の文で示す患者の病証で適切なのはどれか。「57歳の女性。体型はやや肥満で、膝の内側に重だるい痛みを訴える。雨の日は症状が増悪し、下腿がむくむ。疲れやすく軟便になりやすい。」

1. 行 痹
2. 痛 痹
3. 着 痹
4. 熱 痹

はき 15-122 次の文で示す患者の病証で適切なのはどれか。「50歳の男性。頸肩部のこり、目の疲れと乾燥を訴える。1年前から腰下肢が重だるく、手足がほてる。舌は紅く、脈は細数。」

1. 肝腎陰虚
2. 心腎不交
3. 肝脾不和
4. 脾腎陽虚

はき 15-123 次の文で示す患者の病証に対し、発作予防を目的として循経取穴する場合、適切なのはどれか。「61歳の男性。管理職。長時間の会議や強いストレス下で前胸部の痛みを自覚する。発作は間欠的で、痛みは数分で消失する。現在内科に通院中である。」

1. 合 谷
2. 内 関
3. 外 関
4. 列 欠

はき 15-124 次の文で示す患者に対し、任脈と共に施術対象となる経絡はどれか。

「25 歳の女性。月経開始 1 週前からイライラし、乳房と少腹部（脇腹）のはりがある。月経開始と共に症状は軽減する。」

1. 足の陽明経
2. 足の太陽経
3. 足の少陰経
4. 足の厥陰経

はき 15-125 次の文で示す患者に対する治療で八総穴を用いる場合、正しいのはどれか。「53 歳の男性。急性の腰痛で前かがみになると増悪する。」

1. 外 関・臨 泣
2. 後 溪・申 脈
3. 内 関・公 孫
4. 列 欠・照 海

はき 15-126 腎虚証に対し、難経六十九難に基づき補法を行う経穴はどれか。

1. 水 泉
2. 太 白
3. 経 渠
4. 孔 最

はき 15-127 肩関節の外転筋に対する鍼通電療法で刺鍼部位として適切な経穴はどれか。

1. 秉 風・巨 骨
2. 肩外兪・肩中兪
3. 臑 会・消 灤
4. 肩 貞・天 宗

はき 15-128 野球の投球動作でフォロースルー（腕の振り抜き）期に肩後面に痛みがみられる場合、局所治療穴として適切なのはどれか。

1. 天 井
2. 天 宗
3. 天 府
4. 天 牖

はき 15-129 手関節の掌屈ができない末梢性の運動麻痺に対し、罹患筋への局所治療穴として適切なのはどれか。

1. 溫 溜
2. 支 正
3. 郄 門
4. 四 瀆

はき 15-130 ばね指で罹患局所の圧痛に対して施術する場合、適切な部位はどれか。

1. 手根中手関節掌側部
2. 中手指節関節掌側部
3. 近位指節間関節掌側部
4. 遠位指節間関節掌側部

はき 15-131 理学検査所見と罹患局所への治療穴との組合せで適切でないのはどれか。

1. モーリーテスト陽性 — 欠 盆
2. ペインフルアークサイン陽性 — 膏 肓
3. チェアテスト陽性 — 手三里
4. フィンケルスタインテスト陽性 — 偏 歴

はき 15-132 慢性副鼻腔炎に対する局所治療穴で適切なのはどれか。

1. 和 膠
2. 瞳子膠
3. 巨 膠
4. 素 膠

はき 15-133 「45 歳の男性。上肢の痛みとしびれを訴える。上腕外側の知覚鈍麻、三角筋の筋力低下、上腕二頭筋反射減弱。」椎間孔圧迫症状の確認を目的として行う理学検査で正しいのはどれか。

1. アレンテスト
2. スパーリングテスト
3. エデンテスト
4. ライトテスト

はき 15-134 「45 歳の男性。上肢の痛みとしびれを訴える。上腕外側の知覚鈍麻、三角筋の筋力低下、上腕二頭筋反射減弱。」施術対象となる障害高位はどれか。

1. C5
2. C6
3. C7
4. C8

はき 15-135 「35 歳の男性。突然、左眼を閉じることができなくなり、口から唾液が漏れた。症状発現の数日前に耳介部に水疱ができ、耳の痛みを感じた。」出現する可能性のある症状はどれか。

1. 味覚障害
2. 斜 視
3. 顔面部の知覚障害
4. ホルネル徴候

はき 15-136 施術対象となる神経はどれか。

1. 第3脳神経
2. 第4脳神経
3. 第6脳神経
4. 第7脳神経

はき 15-137 「20 歳の男性。急に下腿に著明な浮腫が出現した。労作時呼吸困難はなく、肝機能は正常。高度蛋白尿と高脂血症を認めた。」浮腫の機序として適切なのはどれか。

1. 膠質浸透圧低下
2. 心拍出量減少
3. 門脈圧亢進
4. 静脈圧上昇

はき 15-138 東洋医学の考え方で水分代謝にかかわらない臓はどれか。

1. 肺
2. 心
3. 脾
4. 腎

はき 15-139 「67 歳の男性。数年にわたる湿性咳嗽と息切れで病院での治療を継続中である。」原因疾患で可能性の低いのはどれか。

1. 気管支拡張症
2. 慢性気管支炎
3. 気管支喘息
4. 間質性肺炎

はき 15-140 東洋医学的な診察では肺虚証であった。「虚すればその母を補う」の原則に基づく選穴で正しいのはどれか。

1. 大 敦
2. 陰 谷
3. 太 白
4. 足通谷

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 14) 東洋医学臨床論	123～140
-----------------	---------

はき 14-123 虚寒証に対する刺法で適切でないのはどれか。

1. 経絡の流注方向に沿って刺入する。
2. 吸気時に刺入し、呼気時に抜鍼する。
3. 目的の深さで鍼を留める。
4. 抜鍼後、直ちに鍼孔を閉じる。

はき 14-124 次の文で示す患者の病能に対する鍼通電療法の通電部位として適切なのはどれか。

「53 歳の男性。1 年前から前腕外側から手背にかけての痛みがある。顔を上に向けると痛みが増悪する。
腕橈骨筋反射減弱。」

1. C₄₋₅ 間の直側と五里
2. C₅₋₆ 間の直側と合谷
3. C₆₋₇ 間の直側と内関
4. C₇-Th₁ 間の直側と神門

はき 14-125 肩こりの施術で治療対象となる筋と経穴との組合せで正しいのはどれか。

1. 僧帽筋 ————— 風 池
2. 肩甲挙筋 ————— 曲 垣
3. 棘上筋 ————— 肩外兪
4. 菱形筋 ————— 大 杼

はき 14-126 ドケルバン病に対する局所施術で対象となる罹患筋はどれか。

1. 長母指外転筋
2. 長母指内転筋
3. 短母指屈筋
4. 母指対立筋

はき 14-127 次の文で示す患者への施術対象となる高位障害レベルはどれか。

「40 歳の男性。腰下肢痛を訴える。長母指伸筋と長指伸筋の筋力低下、下腿外側から足背にかけての知覚鈍麻がみられる。膝蓋腱反射・アキレス腱反射は共に正常。」

1. L₃
2. L₄
3. L₅
4. S₁

はき 14-128 足関節の屈曲（底屈）ができない運動麻痺に対し、拮抗筋の緊張緩和を目的とした局所治療穴はどれか。

1. 承 山
2. 飛 揚
3. 陰陵泉
4. 足三里

はき 14-129 理学的検査所見と局所治療穴との組み合わせで適切でないのはどれか。

1. 膝の外反ストレステスト陽性 — 曲 泉
2. チェアテスト陽性 — 曲 池
3. ファレンテスト陽性 — 陽 池
4. パトリックテスト陽性 — 環 跳

はき 14-130 次の文で示す患者の病証に対する治療目的として適切でないのはどれか。

「28歳の女性。湿度が高い日が続くと咳と痰がよくでる。関節痛と倦怠感を伴う。甘い食物を好む。」

1. 脾の運化を改善する。
2. 肝の疏泄を促す。
3. 痰湿の除去を図る。
4. 肺の肅降を促す。

はき 14-131 胃腸疾患に対し、身体部位に基づく配穴法と経穴との組み合わせで誤っているのはどれか。

1. 同経配穴 — 天 枢・太 白
2. 前後配穴 — 中 脘・胃 兪
3. 表裏配穴 — 足三里・公 孫
4. 上下配穴 — 内 関・足三里

はき 14-132 逆気によるのぼせ・下痢に対する施術で適切な五行穴（五兪穴）はどれか。

1. 井 穴
2. 兪 穴
3. 経 穴
4. 合 穴

はき 14-133 次の文で示す患者に対する奇経を用いた治療で適切でないのはどれか。

「28歳の女性。月経が3ヶ月に一度しかなく、経血量も少ない。めまい感があり、食欲がないやせ型で顔色が蒼白く、舌質淡、脈沈細。」

1. 陽維脈
2. 衝 脈
3. 任 脈
4. 帶 脈

はき 14-134 小児瘡の虫に対し伝統的に行われてきた施灸部位はどの高さを結んだ線上の棘突起下にあるか。

1. 肩 峰
2. 肩甲棘内側端
3. 第 12 肋骨先端
4. 腸骨稜

はき 14-135 肝虚証に対し、難経六十九難に基づき補法を行う経穴はどれか。

1. 太 白
2. 経 渠
3. 陰 谷
4. 少 府

次の症例に対してはき 14-136、はき 14-137 の問いに答えよ。

「17 歳の男性。2 ヶ月前から陸上の練習中に右脛骨の下 1/3 に疼痛があり、徐々に走行が困難となった。エックス線像に骨折の所見は見られない。知覚異常はないが足の屈曲(底屈)内反の抵抗運動で疼痛が誘発される。」

はき 14-136 最も考えられるのはどれか。

1. 有痛性外脛骨
2. オスグット病
3. コンパートメント症候群
4. シンスプリント

はき 14-137 施術対象とする罹患筋で適切なのはどれか。

1. 前脛骨筋
2. 後脛骨筋
3. 長腓骨筋
4. 短腓骨筋

次の文で示す患者について、はき 14-138、はき 14-139、はき 14-140 の問いに答えよ。

「本態性高血圧で降圧薬を服用している 78 歳の男性。夜間頻尿を主訴として来院。手足のほてり、腰のだるさがみられ、舌診では舌質紅・無苔、脈診では浮で無力を呈した。随時血圧測定では収縮期血圧 148mmHg、拡張期血圧 84mmHg であった。」

はき 14-138 随時血圧の測定で誤っているのはどれか。

1. 上腕を心臓の高さにして測定する。
2. 仰臥位で測定する。
3. スワンの第 1 点を収縮期血圧とする。
4. マンシェットの圧を 1 秒間に 2mmHg 程度で下げていく。

はき 14-139 本症例の高血圧の治療を放置した場合、臓器障害がみられにくいのはどれか。

1. 心 臓
2. 腎 臓
3. 肝 臓
4. 脳

はき 14-140 証に基づいて、鍼灸治療を行う場合の治療対象となる適切な病証はどれか。

1. 気虚証
2. 血虚証
3. 陰虚証
4. 瘀血証

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 13) 東洋医学臨床論	125～140
-----------------	---------

はき 13-125 東洋医学的治療原則について誤っている記述はどれか。

1. 心理状態を考慮する。
2. 先病が本治法の対象となる。
3. 急性の症状では標治法を優先する。
4. 秋・冬には浅刺する。

はき 13-126 頭痛に対する四総穴で適切なのはどれか。

1. 委 中
2. 合 谷
3. 列 欠
4. 足三里

はき 13-127 末梢性顔面神経麻痺における罹患筋と治療穴との組合せで誤っているのはどれか。

1. 前頭筋 — 曲 差
2. 頬 筋 — 頷 厭
3. 眼輪筋 — 四 白
4. 口輪筋 — 地 倉

はき 13-128 メニエール病のめまいに対し、三焦経の治療穴で適切なのはどれか。

1. 頭竅陰
2. 聴 会
3. 聴 宮
4. 耳 門

はき 13-129 過多月経の治療穴で八会穴を用いる場合、適切なのはどれか。

1. 膻 中
2. 膈 兪
3. 大 杼
4. 懸 鐘

はき 13-130 小児気管支喘息の発作予防の施術で適切でないのはどれか。

1. 肺経の接触鍼
2. 前胸部の管散術
3. 背部兪穴の知熱灸
4. 腹部の多壯灸

はき 13-131 足の冷えに用いる刺法で適切なのはどれか。

1. 陰 刺
2. 短 刺
3. 偶 刺
4. 報 刺

はき 13-132 次の文で示す患者の病証に対し、施術対象となる経路はどれか。

「45歳の女性。目尻から側頭部にかけて痛みがある。口も苦く、よくため息をつく。」

1. 足の少陽経
2. 足の少陰経
3. 手の陽明経
4. 手の太陰経

はき 13-133 上肢痛の原因疾患と局所治療穴との組合せで適切でないのはどれか。

1. 手根管症候群 — 大 陵
2. 円回内筋症候群 — 四 瀆
3. 肘部管症候群 — 小 海
4. 橈骨神経痛 — 消 灤

はき 13-134 次の文で示す患者の病態に対し、施術の対象とされる局所部位はどれか。

「45歳の男性。3か月前からボーリングを始めた。最近、投球動作で右肩に痛みが生じた。ペインフルアーキサイン陰性。スピードテスト陽性。」

1. 結節間溝部
2. 肩甲骨棘下部
3. 肩甲間部
4. 上腕三頭筋部

はき 13-135 肩峰下インピンジメント症候群に対する局所施術で対象となる罹患筋はどれか。

1. 前鋸筋
2. 棘上筋
3. 小胸筋
4. 大円筋

はき 13-136 スポーツ障害と罹患局所への治療穴との組合せで適切でないのはどれか。

1. 水泳肩 — 肩 髃
2. 野球肘 — 少 海
3. ジャンパー膝 — 承 筋
4. シンスプリント — 三陰交

はき 13-137 湿度が高くなると症状が増悪する痺証はどれか。

1. 行 痺
2. 痛 痺
3. 着 痺
4. 熱 痺

はき 13-138 次の文で示す患者の病証に対し、難経六十九難に基づき補法を行う経穴はどれか。

「40 歳の女性。寒がり、くしゃみがよく出る。話すのがおっくうで声に力がない。舌質淡。脈弱。」

1. 曲 泉
2. 大 都
3. 太 淵
4. 少 衝

次の文で示す患者についてはき 13-139、140 の間に答えよ。

「35 歳の女性。コンピュータ作業を続けると目が疲れ、物がぼやけてみえる。月経血量は少ない。爪につやがない。舌質淡。脈は細。」

はき 13-139 五臓の病証で適切なのはどれか。

1. 肝
2. 心
3. 脾
4. 肺

はき 13-140 気血の病証で適切なのはどれか。

1. 気 虚
2. 気 滞
3. 血 瘀
4. 血 虚

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 12) 東洋医学臨床論	125～140
-----------------	---------

はき 12-125 虚証に対する鍼治療で適切なのはどれか。

1. 速刺速抜をする。
2. 抜鍼後、後揉捏をしない。
3. 経絡の流注に逆らって刺鍼する。
4. 呼息時に刺入する。

はき 12-126 後頭部の痛みに対し、遠道刺として取穴される要穴はどれか。

1. 委 中
2. 上巨虚
3. 足三里
4. 委 陽

はき 12-127 腎精不足による耳鳴りに対し、治療穴として適切なのはどれか。

1. 太 淵
2. 太 溪
3. 大 陵
4. 大 都

はき 12-128 次の文で示す患者の病証に対し、相剋関係に基づき瀉法を行う経穴はどれか。

「30歳の女性。風邪をひきやすい。薄い鼻汁、息切れ及び倦怠感を伴う。」

1. 火経および金経の金穴
2. 火経および金経の火穴
3. 木経および土経の土穴
4. 木経および土経の木穴

はき 12-129 次の文で示す患者の病証に対し、補法を行う経絡はどれか。

「60歳の男性。血圧が高く、腰のだるさ、耳鳴り、不眠を伴う。舌質紅。脈は細数。」

1. 足の少陰経
2. 足の陽明経
3. 手の太陰経
4. 手の少陽経

はき 12-130 次の文で示す患者の病証に対し、施術対象となる適切な経絡はどれか。

「25歳の女性。食欲がなく、体が重たく感じ、疲れやすい。脈診では右関上、沈の脈が弱い。」

1. 手の太陽経
2. 手の少陰経
3. 足の少陽経
4. 足の太陰経

はき 12-131 長母指外転筋の腱鞘炎に対し、罹患局所への治療穴で適切なのはどれか。

1. 陽 谷
2. 曲 沢
3. 外 関
4. 偏 歴

はき 12-132 次の文で示す運動麻痺に対し、罹患神経への局所治療穴で適切なのはどれか。

「手の母指内転運動の障害があり、骨間筋の萎縮がみられる。」

1. 郄 門
2. 曲 池
3. 小 海
4. 臂 臑

はき 12-133 罹患神経への治療を目的として陽白穴へ刺鍼を行う場合、対象となる顔面痛はどれか。

1. 舌咽神経痛
2. 三叉神経第1枝痛
3. 三叉神経第2枝痛
4. 三叉神経第3枝痛

はき 12-134 次の文で示す患者の病態に対して施術の対象となる罹患靱帯で適切なのはどれか。

「20歳の女性。陸上の長距離選手。最近、ランニング中に左膝関節の外側部に痛みを感じる。グラスピングテスト陽性。内反ストレステスト陰性。」

1. 膝蓋靱帯
2. 腸脛靱帯
3. 前十字靱帯
4. 外側側副靱帯

はき 12-135 肩背部のこりに対する局所施術における罹患筋と施術部位との組合せで適切でないのはどれか。

1. 菱形筋 — 大 杼
2. 棘下筋 — 天 宗
3. 肩甲挙筋 — 心 兪
4. 僧帽筋 — 肩 井

はき 12-136 理学的検査所見と局所治療穴との組合せで適切でないのはどれか。

1. スピードテスト陽性 — 天 府
2. 手関節背屈テスト陽性 — 支 正
3. 膝の外反ストレステスト陽性 — 曲 泉
4. アキレス腱伸展テスト陽性 — 承 筋

はき 12-137 次の文で示す患者についてはき 12-137、はき 12-138 に答えよ。

「30 歳の男性。就眠後 2～3 時間して、右目の奥にえぐられるような激痛が、発作性・周期性に生じる。顔面紅潮、目の充血、流涙がみられる。怒りっぽい。脈は弦数。」

はき 12-137 最も考えられる疾患はどれか。

1. 三叉神経第 1 枝痛
2. 片頭痛
3. 群発頭痛
4. 緊張型頭痛

はき 12-138 この病証に対する難経六十九難に基づく治療穴はどれか。

1. 行 間・少 府
2. 神 門・太 白
3. 尺 沢・陰 谷
4. 湧 泉・大 敦

はき 12-139 次の文で示す患者について、はき 12-139、はき 12-140 の問いに答えよ。

「65 歳の男性。1 年ほど前から歩行時に左腰部、下腿外側に疼痛が出現するようになった。ケンプ徴侯陽性。足背部に知覚鈍麻がみられる。SLR テスト陰性。」

はき 12-139 最も考えられる疾患はどれか

1. 閉塞性動脈硬化症
2. 腰部椎間板ヘルニア
3. 腰部脊柱管狭窄症
4. 骨粗鬆症

はき 12-140 罹患神経の支配領域に治療穴をとる場合、適切なのはどれか。

1. 外 丘
2. 合 陽
3. 築 賓
4. 三陰交

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 11) 東洋医学臨床論	125～140
-----------------	---------

はき 11-125 次の文で示す患者の病証に対する治療で適切なのはどれか。

「48 歳の女性。夕方になると下腿がむくむ。下痢ぎみで身体が重だるい。手足が冷える。脈は沈遅。」

1. 肝陰を補う。
2. 脾陽を補う。
3. 湿熱を除く。
4. 瘀血を除く。

はき 11-126 次の文で示す患者の病証に対し、治療対象となる適切な経絡はどれか。

「30 歳の女性。半年前から月経周期が不規則で、経血量は少ない。耳鳴り、めまい、腰のだるさがある。」

1. 足の少陽経
2. 足の太陰経
3. 足の少陰経
4. 足の厥陰経

はき 11-127 次の文で示す患者の病証に対する治療で適切でないのはどれか。

「25 歳の女性。身長 160cm、体重 80kg。胸のつかえと口渇を訴え、痰が多く暑がりである。甘いものや油っこいものを好む。」

1. 痰湿を除く。
2. 胃の熱を除く。
3. 脾の運化作用を整える。
4. 肝陽の亢進を抑える。

はき 11-128 次の文で示す患者の病証に対し、難経六十九難に基づいた治療穴はどれか。

「50 歳の女性。食欲不振があり、下痢しやすい。精神疲労と無力感がある。舌質淡、脈は沈細。」

1. 曲 泉・陰 谷
2. 少 府・大 都
3. 太 淵・太 白
4. 復 溜・経 渠

はき 11-129 選穴法則における要穴を応用した配穴法と経穴との組合せで正しいのはどれか。

1. 原絡配穴 — 丘 墟・外 丘
2. 原合配穴 — 衝 陽・豊 隆
3. 翕募配穴 — 肝 兪・期 門
4. 募合配穴 — 中 極・湧 泉

はき 11-130 中枢性顔面神経麻痺に対し、罹患筋への局所治療部位として適切でないのはどれか。

1. 前頭筋部
2. 頬筋部
3. 眼輪筋部
4. 口輪筋部

はき 11-131 次の文で示す患者の病態に対し、施術対象となる罹患神経はどれか。

「45 歳の女性。嚥下時に舌根部から下顎にかけての放散痛が数十秒間出現し、唾液分泌の亢進を伴うことがある。」

1. 三叉神経
2. 顔面神経
3. 舌咽神経
4. 舌下神経

はき 11-132 次の文で示す患者の病態に対し、罹患局所への刺鍼部位として適切なのはどれか。

「50 歳の男性。半年前から肩関節の運動痛がある。特に肘関節を屈曲して抵抗に逆らって前腕を回外すると疼痛が強くなる。」

1. 棘上部
2. 棘下部
3. 結節間溝部
4. 腋窩後壁

はき 11-133 神経麻痺と罹患局所への治療穴との組合せで適切なのはどれか。

1. 副神経麻痺 — 肩 井
2. 腋窩神経麻痺 — 俠 白
3. 尺骨神経麻痺 — 下 廉
4. 橈骨神経麻痺 — 靈 道

はき 11-134 鉤足を呈する運動麻痺に対し、罹患筋への局所治療穴として適切なのはどれか。

1. 承 山
2. 条 口
3. 陽 交
4. 血 海

はき 11-135 絞扼性神経障害とその罹患神経を対象とした治療穴との組合せで適切でないのはどれか。

1. 足根管症候群 — 太 溪
2. 梨状筋症候群 — 承 扶
3. 肘部管症候群 — 小 海
4. 手根管症候群 — 神 門

はき 11-136 耳鳴り・難聴に対する局所治療穴として適切でないのはどれか。

1. 四 白
2. 翳 風
3. 角 孫
4. 和 髎

はき 11-137 鍼施術で気胸を起こさないよう注意しなければならない経穴はどれか。

1. 身 柱
2. 魄 戸
3. 膻 中
4. 三焦俞

はき 11-138 スポーツ障害とその局所治療穴との組合せで誤っているのはどれか。

1. ジャンパー膝 — 犢 鼻
2. シンスプリント — 三陰交
3. 水泳肩 — 天 容
4. テニス肘 — 曲 池

はき 11-139 次の文で示す患者について、はき 11-139、はき 11-140 の間に答えよ。

「65歳の男性。特に思いあたる原因がなく右前腕外側から母指にかけて痛みが出現するようになった。

腕橈骨筋反射減弱。母指背側部に知覚鈍麻がある。ホフマン反射陰性。」最も考えられる疾患はどれか。

1. 頸椎症性神経根症
2. 頸椎症性脊髄症
3. 斜角筋症候群
4. 過外転症候群

はき 11-140 罹患神経の支配領域上に治療穴を取る場合適切なのはどれか。

1. 内 関
2. 臂 臑
3. 陽 池
4. 偏 歴

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 10) 東洋医学臨床論	125～140
-----------------	---------

はき 10-125 次の文で示す患者に対して循経取穴をする場合、適切な経穴はどれか。

「53 歳の女性。電撃性の疼痛が発作的に右下歯、下顎部にかけて走るようになった。」

1. 合 谷
2. 陽 谷
3. 陽 池
4. 大 陵

はき 10-126 次の文で示す患者の病証に対し、難経六十九難に基づき補法を行う経穴はどれか。

「70 歳の女性。加齢とともに難聴になる。腰が冷えてだるい。骨粗鬆症がある。脈は細弱。」

1. 曲 泉・陰 谷
2. 少 衝・大 敦
3. 太 淵・太 白
4. 復 溜・経 渠

はき 10-127 次の文で示す患者の病証に対し、補法を行う経穴はどれか。

「24 歳の女性。1 年前から月経周期が短くなり、量も多くなった。倦怠感、小腹部の下垂感を訴える。」

1. 太 衝
2. 太 白
3. 神 門
4. 太 淵

はき 10-128 疏泄作用の失調から生じた気滞血瘀の肩こりに対し、治療対象となる経絡はどれか。

1. 太陽経
2. 陽明経
3. 厥陰経
4. 少陰経

はき 10-129 次の文で示す患者の病証に対し、治療対象となる臓腑はどれか。

「48 歳の男性。会社員。いつもイライラして眠れない。季肋部に圧痛がある。」

1. 肝と胆
2. 心と小腸
3. 脾と胃
4. 腎と膀胱

はき 10-130 頭痛で頭部局所への刺激により血管拡張を引き起こし症状を増悪させる恐れがあるのはどれか。

1. 緊張型頭痛
2. 片頭痛
3. 変形性頸椎症による頭痛
4. 眼精疲労による頭痛

はき 10-131 次の文で示す患者の病態に対する治療目的で適切でないのはどれか。

「50歳の男性。中間管理職でストレスが絶えない。数日前から頭部全体に締め付けられるような鈍痛がある。」

1. 三叉神経の興奮を抑制する。
2. 後頸部筋の過緊張を緩める。
3. 頭頸部の血管を拡張する。
4. 心身の安静を図る。

はき 10-132 末梢性顔面神経麻痺に対し、罹患神経への局所治療穴として適切なのはどれか。

1. 玉 枕
2. 風 池
3. 完 骨
4. 翳 風

はき 10-133 次の文で示す患者の病態に対し、局所治療穴として適切なのはどれか。

「30歳の女性。保険の外交員。半年前からカバンを持って歩いていると腕がしびれて痛くなる。なで肩。エデンテスト陽性。」

1. 曲 垣
2. 氣 戸
3. 天 鼎
4. 秉 風

はき 10-134 神経痛とその罹患神経を対象にした治療穴との組合せで適切でないのはどれか。

- | | | |
|-------------|---|-----|
| 1. 三叉神経第1枝痛 | — | 陽 白 |
| 2. 大後頭神経痛 | — | 天 柱 |
| 3. 尺骨神経痛 | — | 郛 門 |
| 4. 坐骨神経痛 | — | 承 扶 |

はき 10-135 次の文で示す患者の病態に対し、罹患筋への局所治療として適切なのはどれか。

「42歳の主婦。農作業の手伝いの後、手関節の橈側が痛み腫脹している。」

1. 養 老
2. 通 里
3. 間 使
4. 偏 歴

はき 10-136 次の文で示す運動麻痺に対し、罹患神経への局所治療穴として適切なのはどれか。

「母指球が萎縮し、母指と小指の対立運動が困難である。」

1. 手五里
2. 小 海
3. 内 関
4. 消 灤

はき 10-137 次の文で示す患者の病態に対し、罹患局所への治療部位として適切なのはどれか。

「左殿部から大腿後外側に痛みが放散する。下肢伸展挙上テスト陽性。ボンネットテスト陽性。」

1. 腰三角部
2. 腰方形筋外縁部
3. L4—L5 椎間関節部
4. 梨状筋部

はき 10-138 高血圧に対し、自律神経反射を利用して鍼治療を行う場合、最も効果的な刺鍼部位はどれか。

1. 喉頭隆起の外方
2. 左右の乳頭を結ぶ線の中央
3. 乳様突起と耳垂の間
4. 第7頸椎棘突起の下

はき 10-139 野球肩で、痛みを誘発する自動運動の方向と治療部位との組合せで適切でないのはどれか。

1. 屈 曲 — 結節間溝部
2. 伸 展 — 烏口突起部
3. 外 旋 — 棘下部
4. 外 転 — 棘上部

はき 10-140 次の文で示す患者の病態に対し、適切な刺鍼部位はどれか。

「25歳の男性。テニス選手。最近バックハントストローク時に肘に痛みを感じる。中指伸展テスト陽性。」

1. 曲 池
2. 曲 沢
3. 尺 沢
4. 少 海

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 9) 東洋医学臨床論	125～140
----------------	---------

はき 9-125 東洋医学的な治療原則で誤っているのはどれか。

1. 陰陽の調整
2. 急なれば則ちその標を治す
3. 瀉虚補実
4. 証に基づく治療

はき 9-126 スポーツ障害と罹患局所への治療穴との組合せで適切でないのはどれか。

1. 野球肩 — 臑 会
2. ジャンパー膝 — 犢 鼻
3. アキレス腱炎 — 承 筋
4. フォアハンドテニス肘 — 曲 池

はき 9-127 次の文で示す患者の病証に対し、難経六十九難に基づき補法を行う治療穴はどれか。

「55 歳の男性。慢性の腰下肢痛がある。倦怠感と耳鳴りを伴う。脈は細弱。」

1. 足三里
2. 復 溜
3. 行 間
4. 解 溪

はき 9-128 次の文で示す患者の病証に対し、治療対象となる経絡はどれか。

「35 歳の女性。約 1 か月前から食欲不振となり軟便がある。やせ型で内臓下垂がみられる。」

1. 手の太陽小腸経
2. 手の陽明大腸経
3. 足の太陰脾経
4. 足の厥陰肝経

はき 9-129 次の文で示す患者の病証に対し、気の疎通を図る臓腑はどれか。

「45 歳の女性。のぼせと腰下肢の冷えがある。口渇を伴い、舌尖紅。脈は細弱。」

1. 腎と肝
2. 腎と肺
3. 心と腎
4. 心と脾

はき 9-130 次の文で示す患者の病証に対し、補法を行う経穴はどれか。

「25 歳女性。半年前から月経周期の乱れ、月経血量の減少がある。下肢の筋のひきつり、目のかすみなどを訴える。」

1. 太 衝
2. 衝 陽
3. 太 淵
4. 陽 池

はき 9-131 風寒の邪による顔面麻痺に対し、治療対象となるのはどれか。

1. 太陽経
2. 陽明経
3. 厥陰経
4. 少陰経

はき 9-132 頭部の神経痛と罹患神経を対象とした治療穴との組合せで正しいのはどれか。

1. 三叉神経第 1 枝痛 — 天 柱
2. 三叉神経第 2 枝痛 — 四 白
3. 三叉神経第 3 枝痛 — 浮 白
4. 大後頭神経痛 — 完 骨

はき 9-133 秉風穴から神経刺激を目的として治療を行う場合、対象としている肩関節の運動障害はどれか。

1. 屈 曲
2. 伸 展
3. 外 転
4. 内 旋

はき 9-134 次の文で示す症状に対し、罹患筋への局所治療穴として適切なのはどれか。

「足関節の屈曲および外がえし運動で下腿部の痛みが増悪する。」

1. 足三里
2. 陽 交
3. 合 陽
4. 三陰交

はき 9-135 次の文で示す患者の病態に対する低周波鍼通電療法の通電部位として適切なのはどれか。

「55 歳の男性。頸を右へ側屈すると上肢に鈍痛が起こる。右前腕外側に知覚鈍麻がみられる。」

1. C4－C5 間の直側と肘膠
2. C5－C6 間の直側と偏歴
3. C6－C7 間の直側と大陵
4. C7－C8 間の直側と神門

はき 9-136 次の文で示す患者の病態に対し、適切な刺鍼部位はどれか。

「45歳の男性。右肩前面の痛みを訴える。外転外旋時に痛みがあり、スピードテスト及びヤーガソンテスト陽性。」

1. 棘上部
2. 棘下部
3. 結節間溝部
4. 烏口突起部

はき 9-137 神経麻痺と罹患局所への治療穴との組合せで誤っているのはどれか。

1. 橈骨神経麻痺 — 温溜
2. 尺骨神経麻痺 — 神門
3. 総腓骨神経麻痺 — 浮郄
4. 脛骨神経麻痺 — 懸鍾

はき 9-138 疲労に対する鍼灸治療で最も慎重にしなければならないのはどれか。

1. 肩こりを伴うもの
2. 下肢の冷えを伴うもの
3. 精神的緊張を伴うもの
4. 発熱を伴うもの

はき 9-139 小児疳虫に対し、古来から行われてきた施灸の部位はどの高さの棘突起下にあるか。

1. 左右肩甲棘内端を結ぶ線
2. 左右肩甲骨下角を結ぶ線
3. 左右第1,2肋骨先端を結ぶ線
4. 左右腸骨稜最上部を結ぶ線

はき 9-140 オスグッド病の罹患局所に対する施術部位として適切でないのはどれか。

1. 大腿四頭筋部
2. 側副靱帯部
3. 膝蓋靱帯部
4. 脛骨粗面部

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 8) 東洋医学臨床論	125～140
----------------	---------

はき 8-125 霊枢経脈篇の治療原則で正しい記述はどれか。

1. 虚するときは則ち之を瀉す。
2. 熱するときは則ち之を補す。
3. 寒するときは則ち之を疾す。
4. 陷下するときは則ち之を灸す。

はき 8-126 次の文で示す患者の病証に対し、難経六十九難に基づき補法を行う治療穴はどれか。

「40歳の女性。1年前から歩きすぎると膝が痛み、眩暈と手足のひきつりが時々起こる。脈状は弦脈。」

1. 曲 泉、陰 谷
2. 大 都、少 府
3. 太 淵、太 白
4. 復 溜、經 渠

はき 8-127 次の文で示す病証に対する適切な治療穴はどれか。

「四肢の無力感、息切れ及び食欲不振。顔色が悪く黄色。舌苔白。脈が弱い。」

1. 太 白
2. 太 衝
3. 京 骨
4. 丘 墟

はき 8-128 肩痛の罹患部位と局所治療穴との組合せで適切でないのはどれか。

1. 棘上筋 — 巨 骨
2. 肩甲下筋 — 天 髎
3. 棘下筋 — 天 宗
4. 腱板部 — 肩 髎

はき 8-129 次の文で示す患者の病態に対する適切な治療はどれか。

「35歳の女性。食欲がなく、やせて顔色が悪い。少し動くと息切れがして疲れる。低血圧で朝起きるのがつらい。脈は弱い。」

1. 脾経に補法の灸を行う。
2. 肝経に補法の灸を行う。
3. 腎経に瀉法の鍼を行う。
4. 肺経に瀉法の鍼を行う。

はき 8-130 出産後、頸肩部の経絡が滋養されないことで起こる肩こりに対する適切な治療法はどれか。

1. 心の血を補う。
2. 肝の血を補う。
3. 脾の気を補う。
4. 肺の気を補う。

はき 8-131 理学的検査と刺鍼部位との組合せで適切でないのはどれか。

1. エデンテスト陽性 — 気 戸
2. アドソンテスト陽性 — 欠 盆
3. アレンテスト陽性 — 天 鼎
4. ヤーガソンテスト陽性 — 臑 会

はき 8-132 頭部の神経痛と治療穴との組合せで適切なのはどれか。

1. 三叉神経第1枝痛 — 後 頂
2. 三叉神経第3枝痛 — 完 骨
3. 大後頭神経痛 — 玉 枕
4. 小後頭神経痛 — 百 会

はき 8-133 次の文で示す患者の病態に対する治療穴で適切なのはどれか。

「45歳の女性。1年前から水泳を始めた。最近クロールの際右肩に痛みが起こる。ペインフルアークサイン陽性。」

1. 臑 会
2. 天 府
3. 肩 髃
4. 肩外兪

はき 8-134 次の文で示す患者の病態に対し、罹患部への局所治療穴として適切なのはどれか。

「50歳の男性。左官業。上肢に痛みとしびれが出現し、作業により増悪する。ライトテスト陽性。ジャクソンテスト陰性。」

1. 肩 井
2. 顴 髎
3. 中 府
4. 天 髎

はき 8-135 次の文で示す病態に対し、神経絞扼部に直接刺激を与える治療穴はどれか。

「手掌中央部が痛む。指先の感覚が鈍く、しびれもある。」

1. 曲 池
2. 大 陵
3. 陰 郛
4. 支 正

はき 8-136 次の文で示す患者の病態に対し、適切な刺鍼部位はどれか。

「30歳の男性。椎間板ヘルニアを発症し腰下肢が痛む。患側では足指屈曲時の筋力低下、足底部の知覚鈍麻、アキレス腱反射の減弱がみられる。」

1. L2－L3間の直側
2. L3－L4間の直側
3. L4－L5間の直側
4. L5－S1間の直側

はき 8-137 次の文で示す麻痺に対し、施術対象となる罹患筋はどれか。

「足関節の屈曲が困難となり、爪先立ちができない。」

1. 前脛骨筋
2. 長指伸筋
3. 腓腹筋
4. 短腓骨筋

はき 8-138 次に示す部位への施術が効果的な運動麻痺はどれか。

「鎖骨上窩、腋窩、内側上腕二頭筋溝および浅指屈筋と長掌筋との間」

1. すべての指の伸展不能
2. 四指の内・外転不能
3. 母指対立運動不能
4. 手関節伸展不能

はき 8-139 メニエール病に対する治療方針として適切でないのはどれか。

1. 内耳の循環改善
2. 視機能の改善
3. 自律神経機能の改善
4. 頸部の筋の過緊張の改善

はき 8-140 次の文で示す患者の病態に対し、治療対象となる罹患筋はどれか。

「45歳の男性。テニスをする際、バックハンドストローク時に肘に痛みを感じる。チェアテスト陽性。」

1. 回外筋
2. 橈側手根屈筋
3. 長掌筋
4. 短橈側手根伸筋

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 7) 東洋医学臨床論	125～140
----------------	---------

はき 7-125 次の文で示す病証の治療方針として適切なのはどれか。

「湿熱が筋脈に影響して気血の運行が悪く筋脈、筋肉を栄養できなくなり、右下肢が動かなくなった。」

1. 陽明経の疏通をはかる。
2. 心陽を補う。
3. 肝陽の亢進を抑える。
4. 肺の気を補う。

はき 7-126 次の文で示す患者の病証に対する適切な治療はどれか。

「30歳の女性。月経周期が短く、胸脇部が脹って痛み、怒りっぽくなる。舌質は紅。脈は弦数。」

1. 肝の熱を除く。
2. 脾の熱を除く。
3. 肺の気を補う。
4. 腎の気を補う。

はき 7-127 固摂機能の低下による夜間頻尿で適切な治療はどれか。

1. 肝の血を補う。
2. 心の血を補う。
3. 脾の気を補う。
4. 腎の気を補う。

はき 7-128 次の文で示す患者の病証に対する適切な治療はどれか。

「50歳の男性。よくめまいが起こり、横になると軽減する。顔色は蒼白く疲れやすい。食欲がなく脈状は細。」

1. 気血を補う。
2. 胃熱を除く。
3. 肝陽を抑える。
4. 湿熱を除く。

はき 7-129 次の文で示す患者の病証に対する適切な治療はどれか。

「50歳の男性。失業し心配事が絶えない。不眠、不安、倦怠感を訴える。」

1. 肝の気を補う。
2. 心の気を補う。
3. 脾の気を瀉す。
4. 肺の気を瀉す。

はき 7-130 四総穴で頭から項にかけての痛みに用いられるのはどれか。

1. 合 谷
2. 委 中
3. 列 欠
4. 足三里

はき 7-131 男児の疳の虫に対する灸法で古くから用いられているのはどれか。

1. 左肝兪と右脾兪
2. 右肝兪と左脾兪
3. 左肝兪と右胃兪
4. 右肝兪と左胃兪

はき 7-132 次の文で示す症状に対し、罹患神経の刺激を目的とした治療穴として適切でないのはどれか。

「耳の前方から下顎にかけて発作性に痛む。」

1. 聴 会
2. 攢 竹
3. 頬 車
4. 大 迎

はき 7-133 次の文で示す患者の病態から考えて罹患部への局所治療として適切な経穴はどれか。

「26歳の女性。やせていてなで肩。主訴は右上肢全体の持続的なだるさで、アレンテスト、ジャクソンテストは陰性。エデンテストは陽性である。」

1. 氣 戸
2. 巨 骨
3. 扶 突
4. 肩 井

はき 7-134 次の文で示す患者の病態に対する治療で適切なデルマトームはどれか。

「45歳の男性。手背から中指にかけてしびれと知覚鈍麻とがある。肘関節伸展時の筋力低下、ジャクソンテスト陽性。」

1. C5
2. C6
3. C7
4. C8

はき 7-135 次の文で示す患者の病態から考えて治療対象とする罹患筋はどれか。

「40歳の男性。棚の上のものを整理していて、肩が痛くなった。肩の外転運動をさせると90度前後でのみ痛みが起こる。」

1. 僧帽筋
2. 棘上筋
3. 大胸筋
4. 上腕三頭筋

はき 7-136 次の文で示す患者の病態から考えて罹患部への局所治療として適切な刺鍼部位はどれか。

「60 歳の男性。3 か月前より右腰から殿部にかけて痛む。体幹の前屈時痛はないが、右斜め後ろに反らせた時、痛みが出現する。腰部正中より外方約 2 c m に圧痛がある。」

1. 右腰方形筋
2. 右脊柱起立筋
3. 右仙腸関節
4. 右腰椎椎間関節

はき 7-137 次の文で示す運動麻痺に対し、罹患神経の刺激を目的とした適切な治療穴はどれか。

「足関節の屈曲（底屈）と足指の屈曲が困難。」

1. 外 丘
2. 足三里
3. 陰陵泉
4. 承 山

はき 7-138 顎関節症の開口障害に対し罹患部への局所治療として適切な経穴はどれか。

1. 四 白
2. 陽 白
3. 下 関
4. 迎 香

はき 7-139 下腿の慢性コンパートメント症候群の他動運動と患部への刺鍼部位との組合せで誤っているのはどれか。

- | | |
|-----------------|-------|
| 1. 母指の屈曲時痛 | — 解 溪 |
| 2. 母指の伸展時痛 | — 太 衝 |
| 3. 内がえし時痛 | — 懸 鐘 |
| 4. 足関節の伸展（背屈）時痛 | — 承 筋 |

はき 7-140 次の文で示す患者の病態に対する施術目的で最も適切なのはどれか。

「76 歳の男性。主訴は右下肢痛。間欠性跛行があり、足背動脈及び後脛骨動脈の触知が困難である。下肢の知覚や深部反射に異常はない。」

1. 腰部の神経根への圧迫の改善
2. 腰部の筋緊張改善
3. 下肢の末梢循環改善
4. 下肢の筋力増強

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 6) 東洋医学臨床論	125～140
----------------	---------

はき 6-125 東洋医学的な治療原則で適切なのはどれか。

1. 急なれば本を治す。
2. 緩なれば標を治す。
3. 虚すればこれを瀉す。
4. 有余なればこれを瀉す。

はき 6-126 次の文で示す患者の病証に対する治療方針で適切でないのはどれか。

「45歳の男性。1週間前から後頭部、後頭部、側頭部にかけて締めつけられるような頭痛があり、雨の降る日には増悪する。食欲不振、軟便を伴う。」

1. 脾の運化作用を整える。
2. 湿を除く。
3. 肝陽を降ろす。
4. 頭部へ気血をめぐらす。

はき 6-127 下顎歯の痛みを軽減する目的で、循経取穴をする場合に適切な経穴はどれか。

1. 温溜
2. 孔最
3. 郄門
4. 陽池

はき 6-128 次の文で示す患者の症状発現部位への治療穴で適切でないのはどれか。

「40歳の男性。半年前から腕が痛む。C5デルマトーム領域の知覚鈍麻。スパーリングテスト陽性。」

1. 俠白
2. 臑会
3. 肩髃
4. 肩貞

はき 6-129 次の文で示す症状を起こす罹患神経の絞扼部に対する刺鍼部位はどれか。

「痛みとしびれが第1～3指の掌側と第4指の橈側の掌側にある。ファールンテスト陽性。」

1. 円回内筋の上腕頭と尺骨頭との間
2. 尺側手根屈筋の上腕頭と尺骨頭との間
3. 手根骨と屈筋支帯との間
4. 豆状骨と有鉤骨鉤との間

はき 6-130 手の2指～5指の内・外転運動ができない症状に対する治療で、神経刺激を目的とした治療穴はどれか。

1. 外 関
2. 曲 池
3. 支 正
4. 郄 門

はき 6-131 次の文で示す症状を起こす罹患神経に対し、施術対象となる経絡はどれか。

「ヒラメ筋、後脛骨筋、長母指屈筋の麻痺のために歩行困難をきたしている。」

1. 足の陽明胃経
2. 足の太陽膀胱経
3. 足の少陽胆経
4. 足の厥陰肝経

はき 6-132 第5腰椎と第1仙椎間の來脊穴刺鍼で治療効果が期待できる症状はどれか。

1. 大腿前面部のしびれ
2. 大腿外側部のしびれ
3. 下腿内側部のしびれ
4. 足背部のしびれ

はき 6-133 次の文で示す症状に対する施術で難経六十九難に基づく治療穴はどれか。

「皮膚がざらつき鼻水がでて、胸が張り、咳がでる。」

1. 曲 泉・陰 谷
2. 大 都・少 府
3. 太 淵・太 白
4. 復 溜・経 渠

はき 6-134 次の文で示す病証に対する治療方針で適切なのはどれか。

「空腹感はあるが食欲がない。口が乾くが飲みたがらない。ときおり乾嘔（からえずき）し、便秘がある。脈は細数。」

1. 脾胃を補う。
2. 肝胆を補う。
3. 肺大腸を瀉す。
4. 腎膀胱を瀉す。

はき 6-135 早朝の無痛性下痢（五更泄瀉）の治療に用いる経絡はどれか。

1. 手の陽明経
2. 手の少陰経
3. 足の厥陰経
4. 足の少陰経

はき 6-136 次の文で示す患者に対する治療で適切でないのはどれか。

「68 歳の男性。次第に耳が聞こえなくなり、最近では耳鳴りも伴うようになってきた。耳鼻科では加齢によるものとされた。腰のだるさ、夜間頻尿があり、疲労時には耳鳴りが増強する。」

1. 精と血を補う。
2. 痰湿を除く。
3. 足の少陰経の経穴に刺鍼する。
4. 手の太陽経の募穴に刺鍼する。

はき 6-137 次の文で示す患者に対する治療法で適切なのはどれか。

「50 歳の男性。半年前からめまいがある。怒りっぽく顔は赤い。脈は弦数。」

1. 腎経の瀉
2. 肝経の瀉
3. 脾経の瀉
4. 肺経の瀉

はき 6-138 次の文で示す患者の治療対象となる適切な病証はどれか。

「4 回の出産を経験した 38 歳の女性。めまい、耳鳴りがあり、腰が冷えてだるい。脈は沈。」

1. 肝 虚
2. 脾 虚
3. 肺 虚
4. 腎 虚

はき 6-139 スポーツ障害と患部への刺鍼部位との組合せで適切なのはどれか。

1. 外側上顆炎 — 陽陵泉
2. 内側上顆炎 — 陰陵泉
3. 膝蓋靱帯炎 — 足三里
4. 棘上筋腱損傷 — 肩 髃

はき 6-140 高齢者の肺気腫に対する鍼施術で気胸を起こさないよう注意しなければならない経穴はどれか。

1. 定 喘
2. 天 突
3. 膏 肓
4. 膻 中

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 5) 東洋医学臨床論	125～140
----------------	---------

はき 5-125 下部頸椎棘突起直側に刺鍼することで最も治療効果が期待できる症状はどれか。

1. 腕を背中にまわすと肩関節が痛む。
2. つり革につかまっていると指先がしびれる。
3. 空を見上げると腕が痛む。
4. 腕枕をして眠った後、手関節が伸びない。

はき 5-126 次の文で示す患者の病証に対する治療で適切なのはどれか。

「29歳の女性。出産後より肩こりが起こった。目のかすみがあり、爪は白っぽい。脈状は細。」

1. 肝の血を補う。
2. 風寒の邪を除く。
3. 肝の陽気のたかぶりを抑える。
4. 気の滞りを解消する。

はき 5-127 次の文で示す患者の病態に対する刺鍼部位はどれか。

「35歳の男性。肩関節外側部の痛みを訴える。上腕骨上端の圧痛、ペインフルアークサイン陽性。」

1. 肩甲骨棘下窩中央
2. 腱板部
3. 結節間溝部
4. 鎖骨上窩部

はき 5-128 次の文で示す症状に対する治療穴で適切なのはどれか。

「母指、示指、中指の掌面にしびれがあり、手の回内がしにくい。」

1. 郄 門
2. 曲 池
3. 天 井
4. 神 門

はき 5-129 次の文で示す症状に対し、神経刺激を目的とした適切な治療穴はどれか。

「橈骨手根関節および中手指節関節の伸展が困難である。」

1. 臑 兪
2. 消 瀆
3. 肩 髃
4. 俠 白

はき 5-130 次の文で示す患者への低周波鍼通電療法で適切なデルマトームはどれか。

「40歳の男性。1か月前から腰痛および下腿前外側から足背にかけての痛みとしびれ感とがある。ブラグー
ド徴候陽性。」

1. L1
2. L3
3. L5
4. S2

はき 5-131 下肢の神経と絞扼部位への刺鍼点との組合せで正しいのはどれか。

1. 外側大腿皮神経 — 上前腸骨棘内側下部
2. 坐骨神経 — 第2後仙骨孔
3. 総腓骨神経 — 大腿後側中央部
4. 伏在神経 — 大腿外側中央部

はき 5-132 膝に痛みを起こす疾患と患部の治療穴との組合せで最も適切なのはどれか。

1. 変形性膝関節症 — 三陰交
2. ジャンパー膝 — 犢鼻
3. 内側半月板損傷 — 風市
4. オスグッド病 — 委中

はき 5-133 古来より「逆子」の灸治療でよく用いられている治療穴はどれか。

1. 合谷
2. 三焦俞
3. 梁丘
4. 至陰

はき 5-134 次の文で示す患者の治療として適切でないのはどれか。

「18歳の女子高校生。便秘と下痢が交互に起こり、便秘の時の便は兎糞状で硬い。定期試験が近づくと症状
が悪化する。」

1. 臍に塩灸をする。
2. 天枢に浅刺する。
3. 大腸俞に置鍼する。
4. 小野寺殿部圧診点に知熱灸をする。

はき 5-135 急性胃炎の患者に対し脊髄分節を考慮して刺鍼する場合、適切でない経穴はどれか。

1. 鳩尾
2. 梁門
3. 中脘
4. 腹結

はき 5-136 次の文で示す患者の治療対象となる適切な病証はどれか。

「寝つきが悪く、すぐに目がさめてなかなか寝つかれない。食後の腹部膨満感、軟便などがある。脈状は緩脈。」

1. 腎 虚
2. 肺 虚
3. 脾 虚
4. 肝 虚

はき 5-137 次の文で示す患者の病証に対する適切な治療方針はどれか。

「67歳の男性。頻尿と残尿感がある。腰の重だるさ、足の冷えを伴う。下腹部に抵抗がなく、尺中の脈は弱い。」

1. 肝陰を補う。
2. 心陽を補う。
3. 胃陰を補う。
4. 腎陽を補う。

はき 5-138 円形脱毛症に対する鍼灸治療で適切でないのはどれか。

1. 脱毛部への梅花鍼
2. 脱毛部周囲への散鍼
3. 脱毛部周囲への知熱灸
4. 脱毛部への焦灼灸

はき 5-139 次の文で示す患者の治療対象となる筋はどれか。

「30歳の男性。野球選手。ボールを投げるとき肩関節外転外旋の肢位で痛みが起きる。ヤーガソンテスト陽性。」

1. 上腕三頭筋長頭
2. 上腕三頭筋内側頭
3. 上腕二頭筋長頭
4. 上腕二頭筋短頭

はき 5-140 次の文で示す患者の治療対象となる適切な病証はどれか。

「72歳の女性。主訴は健忘。動悸があり、夢をよくみる。食欲不振、軟便などがあり、性格的には思い悩む傾向が強い。」

1. 心と脾の病証
2. 肝と脾の病証
3. 心と腎の病証
4. 肝と腎の病証

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 4) 東洋医学臨床論	125～140
----------------	---------

はき 4-125 病態と治療部位との組合せで誤っているのはどれか。

1. 神経痛 — フレー圧痛点
2. 内臓痛 — ヘッド過敏帯
3. 運動麻痺 — 電気運動点
4. 末梢循環障害 — 撮診点

はき 4-126 次の文で示す患者の病態から考えて、罹患神経に対する局所治療として適切な経穴はどれか。

「38 歳女性。時々、頬部が電撃様に数分痛み、涙が出る。」

1. 迎 香
2. 大 迎
3. 攢 竹
4. 陽 白

はき 4-127 僧帽筋のこりに直接刺激を与える経穴はどれか。

1. 完 骨・欠 盆・肩 貞
2. 翳 風・天 膠・臑 兪
3. 天 鼎・肩 髃・臑 会
4. 天 膠・肩中兪・風 門

はき 4-128 次の文で示す患者の治療目的で適切な記述はどれか。

「45 歳女性。やせ型で低血圧。倦怠感、立ちくらみ、軟便及び食欲不振があり、脈は細く弱い。腹部中央部が軟弱であり、脛骨内縁に沿って陥凹がみられる。」

1. 小腸の気をたかめる。
2. 大腸の気をたかめる。
3. 脾の気をたかめる。
4. 肝の気をたかめる。

はき 4-129 次の文で示す患者の治療で適切なデルマトーム領域はどれか。

「35 歳男性。1 年前から前腕外側から手にかけて痛みがある。スパーリングテスト陽性。母指と示指との触覚鈍麻があり、合谷、曲池、および列欠に圧痛がみられる。」

1. C5
2. C6
3. C7
4. C8

はき 4-130 次の文で示す患者の治療対象とする病証で適切なのはどれか。

「腰が重だるく、夜間頻尿を伴い、下肢が冷え、力が入らない。下腹部が柔らかく、尺中の脈は弱い。」

1. 腎の病証
2. 肺の病証
3. 脾の病証
4. 肝の病証

はき 4-131 下肢の末梢神経領域の痛みと局所治療穴との組合せで正しいのはどれか。

1. 伏在神経 — 承 扶
2. 外側大腿皮神経 — 豊 隆
3. 閉鎖神経 — 足三里
4. 総腓骨神経 — 陽陵泉

はき 4-132 次の文で示す患者の刺鍼対象とする部位はどれか。

「25 歳男性。肩関節前部の痛みを訴える。結節間溝部の圧痛。ヤーガソンテスト陽性。」

1. 棘上筋腱
2. 三角筋後部線維
3. 上腕二頭筋長頭筋腱
4. 大円筋

はき 4-133 次の文で示す患者に対する局所施術で適切でないのはどれか。

「35 歳女性。左膝が痛み、熱感と腫張がある。血液検査では R A テスト陽性、C R P 値は高い。」

1. 膝関節の関節腔内刺鍼
2. 膝関節周囲の皮膚鍼
3. 膝関節周囲の筋・腱への刺鍼
4. 膝関節周囲の糸状灸

はき 4-134 次の文で示す運動麻痺の罹患神経に対する治療穴として適切なのはどれか。

「手背の骨間溝が著名で鷲手がみられる。フローマン徴候陽性。」

1. 支 正
2. 郄 門
3. 偏 歴
4. 大 陵

はき 4-135 次の文で示す患者に対する治療方針で瀉法を行う適切な経絡はどれか。

「45 歳の女性。痰がでて息苦しく、痰は少なく粘る。顔面紅潮、喉の渇きがある。脈は実。」

1. 腎 経
2. 肺 経
3. 脾 経
4. 肝 経

はき 4-136 次の文で示す患者の治療対象となる病証で適切なのはどれか。

「52歳の女性。主訴は耳鳴り。顔面紅潮、口が苦い、怒りっぽい、便秘などの症状がある。肩の張ったようなこり、胸脇苦満がみられる。脈は弦で数。」

1. 肝の病証
2. 心の病証
3. 脾の病証
4. 肺の病証

はき 4-137 末梢顔面神経麻痺における麻痺筋と治療穴との組合せで誤っているのはどれか。

1. 前頭筋 — 陽 白
2. 頬 筋 — 睛 明
3. 口輪筋 — 地 倉
4. 眼輪筋 — 承 泣

はき 4-138 次の文で示す患者の治療対象とする病証で適切なのはどれか。

「50歳の男性。肥満しており筋肉は弛んでいる。無力感、息切れがあり、動くと汗がでる。寒がり、食欲不振および食後の腹部膨満感を訴える。脈は細く遅い。」

1. 肝虚証
2. 心虚証
3. 脾虚証
4. 肺虚証

はき 4-139 小児に対するちりげの灸で用いられる経穴はどれか。

1. 百 会
2. 身 柱
3. 腎 兪
4. 三陰交

はき 4-140 次の文で示す患者に対する治療で誤っている記述はどれか。

「18歳の男性。陸上選手。最近、走り込むとアキレス腱部に痛みが起こる。熱感、腫張はない。アキレス腱を伸展すると痛みが誘発される。」

1. 練習を中止するように指導する。
2. アキレス腱部の圧痛点に刺鍼する。
3. 足関節を底屈位で固定する。
4. アキレス腱部を温める。

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 3) 東洋医学臨床論	125～140
----------------	---------

はき 3-125 肩甲挙筋のこりに対する適切な治療穴はどれか。

1. 天 柱
2. 天 髎
3. 肩中兪
4. 膏 肓

はき 3-126 次の文で示す患者の病態から考えて緊張を改善すべき適切な筋はどれか。

「33歳の女性。3日前から腕をあげて作業をすると上肢が重だるく、しびれるようになってきた。ジャクソンテスト陰性、ライトテスト陽性、3分間挙上負荷試験陽性であった。」

1. 胸鎖乳突筋
2. 僧帽筋
3. 小胸筋
4. 棘上筋

はき 3-127 神経痛と罹患神経を対象とした刺鍼経穴との組合せで適切なのはどれか。

1. 後頭神経痛 — 完 骨
2. 三叉神経第2枝痛 — 四 白
3. 正中神経痛 — 小 海
4. 坐骨神経痛 — 風 市

はき 3-128 C₆デルマトーム領域の疼痛に対する局所治療穴として適切な組合せはどれか。

1. 消 瀲 — 臑 会
2. 曲 沢 — 神 門
3. 孔 最 — 合 谷
4. 肩 貞 — 天 井

はき 3-129 理学的検査所見と刺鍼部位との組合せで適切なのはどれか。

1. ボンネットテスト陽性 — 殿 部
2. マクマリーテスト陽性 — 腹 部
3. パトリック徴候陽性 — 肩上部
4. ニュートンテスト陽性 — 後頸部

はき 3-130 次の文で示す神経麻痺で、麻痺神経に対する治療穴として正しいのはどれか。

「足関節は底屈し、内反もある。歩行は鶏歩となる。」

1. 髀 関
2. 陽陵泉
3. 承 筋
4. 湧 泉

はき 3-131 気管支喘息の治療目的として適切な記述はどれか。

1. 気管支筋の緊張を緩める。
2. 副交感神経の興奮性を高める。
3. 咽頭反射を高める。
4. 気道の過敏性を高める。

はき 3-132 古くから行われている食あたりに対する灸治療はどれか。

1. ちりげの灸
2. 腰部八点灸
3. 患門の穴の灸
4. 裏内庭の灸

はき 3-133 次の文で示す患者の治療対象とする病証で適切なのはどれか。

「55歳の男性。めまい、目のかすみ、こむら返りを訴える。爪が白く、脈状は細。」

1. 肝の病証
2. 脾の病証
3. 肺の病証
4. 心の病証

はき 3-134 次の文で示す患者の病証はどれか。

「夜間の潮熱、手足のほてり、盗汗を主症状とし、脈は細、数。随伴症状として不眠や便秘がみられる。」

1. 気虚証
2. 陽虚証
3. 陰虚証
4. 血虚証

はき 3-135 次の文で示す患者の治療方針として最も適切なのはどれか。

「倦怠感、四肢無力、食欲不振、腹部膨満感、泥状便、脈は弱い。」

1. 肝気を補う。
2. 心気を補う。
3. 肺気を補う。
4. 脾気を補う。

はき 3-136 上歯痛に対する循経取穴で正しいのはどれか。

1. 大腸経の経穴
2. 胃経の経穴
3. 三焦経の経穴
4. 小腸経の経穴

はき 3-137 不眠に伴う症状で鍼灸治療が最も適応となるのはどれか。

1. 睡眠飢餓
2. 幻覚・妄想
3. 躁うつ状態
4. 強迫症状

はき 3-138 婦人科系の症状で鍼灸治療が最も適応するのはどれか。

1. 過多月経
2. 月経前緊張症
3. 黄帯下
4. 不正性器出血

はき 3-139 ジャンパー膝への鍼通電療法の対象として最も適切な筋はどれか。

1. 大腿四頭筋
2. 大腿二頭筋
3. 下腿三頭筋
4. 前脛骨筋

はき 3-140 高齢者の疾患の特徴として適切でない記述はどれか。

1. 多臓器病変を有することが多い。
2. 脱水症状を起こしやすい。
3. 精神症状を示しやすい。
4. 典型的な症状を示すことが多い。

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 2) 東洋医学臨床論	125～140
----------------	---------

はき 2-125 筋肉のひきつりや、こりに適した十二刺の刺法はどれか。

1. 陰 刺
2. 恢 刺
3. 揚 刺
4. 浮 刺

はき 2-126 頭痛と経絡との関係に基づいて治療する場合で正しい組合せはどれか。

1. 頭頂部痛 — 足の陽明胃経
2. 側頭部痛 — 足の少陽胆経
3. 前頭部痛 — 足の太陽膀胱経
4. 後頭部痛 — 足の厥陰肝経

はき 2-127 次の文で示す患者で末梢神経を直接対象として刺鍼するのに適した経穴はどれか。

「48 歳の女性。突然前額部に電撃様の痛み発作が数分間続いた。その後もしばしば発作が起こる。」

1. 大 迎
2. 四 白
3. 角 孫
4. 陽 白

はき 2-128 次の文で示す患者の治療対象とする病証はどれか。

「35 歳の女性。半年前からめまい、目のかすみ、下肢のしびれ、月経周期の乱れ、月経量の減少がある。」

1. 肝血虚証
2. 脾陽虚証
3. 肺気虚証
4. 腎陰虚証

はき 2-129 胸部の帯状疱疹痛について適切でない施術はどれか。

1. 疼痛領域を囲む水平刺
2. 発疹への直刺
3. 罹患神経の高さで脊柱直側の置鍼
4. 疼痛領域を挟む鍼通電療法

はき 2-130 腹痛のうち鍼灸治療が適応となる状況はどれか。

1. 著しい体重減少と食事の嗜好の変化
2. 下痢と便秘とが交代しストレスにより増悪
3. 嚥下困難と嚥下痛
4. 飲酒家で心窩部の激痛と悪心

はき 2-131 次の文で示す患者の治療対象となる経絡はどれか。

「40歳の男性。2か月前から胃の膨満感、食欲不振および軟便があり、下腿内側で脛骨の際に沿って陥凹がみられる。」

1. 手の厥陰心包経
2. 手の陽明大腸経
3. 足の太陰脾経
4. 足の少陰腎経

はき 2-132 月経困難症に対する鍼灸治療で誤っている記述はどれか。

1. 内分泌系の機能の調整をはかる。
2. 腰仙部の経穴を用いる。
3. 下腹部の刺鍼は避ける。
4. 三陰交を用いる。

はき 2-133 理学的検査所見と刺鍼部位との組合せで適切でないのはどれか。

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. ライトテスト陽性 | — 後頸部 |
| 2. ヤーガソンテスト陽性 | — 上腕二頭筋長頭腱部 |
| 3. ペインフルアークサイン陽性 | — 腱板部 |
| 4. アレンテスト陽性 | — 斜角筋部 |

はき 2-134 次の文で示す患者の治療対象となる主たる経絡はどれか。

「53歳の男性。慢性の腰下肢痛があり、全身倦怠感、耳鳴および性欲減退を伴う。脈は細くて弱い。」

1. 足の太陽膀胱経
2. 足の少陰腎経
3. 足の太陰脾経
4. 足の陽明胃経

はき 2-135 根性坐骨神経痛で罹患神経を対象とした刺鍼部位として適切でないのはどれか。

1. 膝窩中央部
2. 梨状筋下孔部
3. 第5腰椎棘突起の直側
4. 第2腰椎棘突起の直側

はき 2-136 次の文で示す神経麻痺で、麻痺神経と治療穴との組合せで正しいのはどれか。

「母指が外転位で、母指と小指との対立運動が困難である。また母指球の萎縮があり、手掌が扁平となっている。」

- | | |
|---------|-------|
| 1. 橈骨神経 | — 手三里 |
| 2. 正中神経 | — 内関 |
| 3. 尺骨神経 | — 支正 |
| 4. 筋皮神経 | — 消灤 |

はき 2-137 境界域高血圧症患者の生活指導で誤っているのはどれか。

1. 安 静
2. 禁 煙
3. 禁 酒
4. 減塩食

はき 2-138 次の文で示す患者の治療として適切でないのはどれか。

「主訴は肥満。甘いものや油っこいものを好む。胸のつかえ、口渇、痰が多く暑がりである。」

1. 肺の熱を除く。
2. 胃の熱を除く。
3. 痰飲を除く。
4. 脾の運化をたすける。

はき 2-139 陽虚証に対する刺法で誤っているのはどれか。

1. 速刺速抜
2. 経気の流れに沿った刺鍼
3. 置鍼
4. 呼気にあわせた刺鍼

はき 2-140 スポーツ外傷・障害と刺鍼する筋との組合せで正しいのはどれか。

1. バックハンドテニス肘 — 前腕伸筋
2. フォアハンドテニス肘 — 前腕回外筋
3. シンスプリント — 三角筋
4. コンパートメント症候群 — 大腿四頭筋

実施日	月 日 ()	科目	東洋医学臨床論	学年	年	点数	
学部		番号		名前		正答率	%

(はき 1) 東洋医学臨床論	125～140
----------------	---------

はき 1-125 変形性膝関節症に対する施術目的で適切でないのはどれか。

1. 変形の改善
2. 軟部組織の緊張緩和
3. 関節部の循環改善
4. 関節痛の軽減

はき 1-126 罹患神経上に治療経穴を取る場合、誤っている組合せはどれか。

1. 橈骨神経痛 — 消 瀲
2. 尺骨神経痛 — 小 海
3. 坐骨神経痛 — 承 扶
4. 大腿神経痛 — 陰 谷

はき 1-127 35歳の女性。数年前から時々頭頂部に発作的な痛みがある。気分はイライラし、時々目がかすみ、手足の筋肉がひきつることがある。脈は弦脈である。治療の対象となる主たる経絡はどれか。

1. 手の少陰心経
2. 手の太陽小腸経
3. 足の太陽膀胱経
4. 足の厥陰肝経

はき 1-128 眠りが浅く夢をよくみる。動悸、健忘、倦怠感、食欲不振、軟便の症状を伴う患者の鍼灸治療について正しいのはどれか。

1. 心と肝の病証なので主として心包経と肝経との関連経穴を用いる。
2. 肝と脾の病証なので主として肝経と脾経との関連経穴を用いる。
3. 心と腎の病証なので主として心包経と腎経との関連経穴を用いる。
4. 心と脾の病証なので主として心包経と脾経との関連経穴を用いる。

はき 1-129 高齢者の鍼灸治療上の配慮で誤っているのはどれか。

1. 起立性低血圧に注意する。
2. 強い刺激を求めるときは、それに応じた治療を行う。
3. 施術前の脈拍、血圧をみてから治療する。
4. 施術前に排尿させる。

はき 1-130 「45歳の男性。2日前からかぜ症状があったが、今朝は左眼瞼の開閉不能、食物が左口角から漏れるようになった。鼻唇溝消失がみられる。」障害神経を目標に施術する場合の適切な経穴はどれか。

1. 風 府
2. 風 門
3. 秉 風
4. 翳 風

はき 1-131 「50 歳の男性。易疲労、腰がだるく手足の厥冷を訴える。顔色はやや黒ずみ、頭髮はうすく聴力の減退がある。」治療対象とする病証はどれか。

1. 肝虚証
2. 脾虚証
3. 肺虚証
4. 腎虚証

はき 1-132 耳鳴や難聴の鍼灸治療について誤っているのはどれか。

1. 耳門、聴会、翳風はよく使用する経穴である。
2. 腎経の経穴を用いることが多い。
3. 感音系難聴は治りやすい。
4. 難聴を伴わない耳鳴は適応となる場合がある。

はき 1-133 下痢の対応で誤っているのはどれか。

1. 冷えによる下痢には温灸がよく用いられる。
2. 四総穴を用いる場合は委中を使用する。
3. 過敏性腸症候群の下痢は心身の安静が必要である。
4. 脱水症を伴う下痢は施術を控える。

はき 1-134 上腕骨外側上顆炎の治療穴として局所の経穴を考慮する場合、適するのはどれか。

1. 曲 池
2. 曲 沢
3. 尺 沢
4. 少 海

はき 1-135 絞扼神経障害の絞扼部位と近接経穴との組合せで正しいのはどれか。

1. 手根管症候群 — 大 陵
2. 肘部管症候群 — 尺 沢
3. 足根管症候群 — 崑 崙
4. 尺骨神経管症候群 — 小 海

はき 1-136 小児気管支喘息に対する鍼灸治療で適切なのはどれか。

1. 喘息発作中はまず天突に刺鍼する。
2. 六十九難によれば肺経では太淵を用いる。
3. 体性内臓反射理論によれば T h 5－T h 7 の脊髄分節上の経穴を刺激する。
4. 募穴を用いる場合は膻中を用いる。

はき 1-137 次の症例について、問いに答えよ。

「40 歳の男性。残業が続き 1 週間前から項部、後頭部に締め付けられるような鈍痛と肩こりがある。医療機関での検査では頭蓋内病変はないという。」最も予想される疾患はどれか。

1. 片頭痛
2. 筋収縮性頭痛
3. 高血圧性頭痛
4. 群発性頭痛

はき 1-138 次の症例について、問いに答えよ。

「40 歳の男性。残業が続き 1 週間前から項部、後頭部に締め付けられるような鈍痛と肩こりがある。医療機関での検査では頭蓋内病変はないという。」鍼灸治療で適切なのはどれか。

1. 患部の筋緊張部への刺鍼
2. 頭部の血管拍動部への刺鍼
3. 胃経の要穴への刺鍼
4. 洞 刺

はき 1-139 次の症例について問いに答えよ。

「28 歳の女性。2 年前より右前腕から手部にかけて鈍痛を覚えるようになった。現在は上肢の脱力感、しびれに加え冷えも感じるようになり、上肢の挙上で症状は増悪する。」この患者に行うテストとして適切でないのはどれか。

1. ライトテスト
2. アドソンテスト
3. アプレーテスト
4. モーリーテスト

はき 1-140 病態に関連する治療経穴として適切でないのはどれか。

1. 天 鼎
2. 気 戸
3. 中 府
4. 大 包